

2582 - RACTOMAX 5KG
2645 – RACTOMAX 25KG

Aditivo melhorador de desempenho.

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO:

Casca de arroz (55,9%), óleo vegetal, cloridrato de Ractopamina, Dióxido de Silício.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO:

Cloridrato de Ractopamina ... 20,00 g/kg

INDICAÇÃO DO PRODUTO:

Ractomax é indicado para uso exclusivo em suínos em fase de terminação, para aumentar a taxa de ganho de peso, melhorar a eficiência alimentar e promover uma carcaça magra em suínos.

ESPÉCIE ANIMAL A QUE SE DESTINA:

Suínos.

MODO DE USAR:

Ractomax é um produto formulado para ser adicionado á ração dos suínos na fase de terminação, na proporção de 250 g a 1000 g por tonelada de ração, o que corresponde de 5 ppm a 20 ppm de Ractopamina por tonelada de ração. Para uma mistura mais homogênea, recomenda-se fazer inicialmente uma pré mistura, isto é, separar a quantidade pesada de Ractomax a ser incluída na ração e misturar em uma pequena quantidade de farelo (soja, milho ou similar), para depois incluir esta, no restante da mistura final.

A ração com Ractomax deverá ser a única fonte de alimento para os suínos nesta fase do ciclo produtivo. É recomendável também que não se misture o produto ao mesmo tempo com o óleo vegetal quando este for adicionado à ração.

CUIDADOS:

Ractomax é um produto para uso exclusivo em suínos na fase de terminação. Não deve ser usado nas outras fases e em nenhuma outra espécie. Para manipular o produto, é recomendada a utilização de equipamentos de segurança individuais (EPIs), tais como, botas, roupas de proteção, luvas, máscara para pós, óculos. Não comer ou fumar no local e em quanto manipula o produto. Depois de manipular, lavar as mãos com abundante quantidade de água e sabão. Não reutilizar as embalagens vazias do produto. Não utilizar nem guardar perto de bebidas, alimentos, medicamentos, produtos de higiene doméstica e do fogo.

ATENÇÃO:

Ractomax não se destina para uso em seres humanos. O Cloridrato de ractopamina, ingrediente ativo do ractomax, é um agonista beta-adrenérgico, portanto, pessoas com doenças cardiovasculares devem tomar precauções especiais para evitar exposição ao produto.

PERÍODO DE RETIRADA:

Ractomax não requer de período de retirada antes do abate.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto na sua embalagem original, fechada, em temperatura entre 15 e 30 graus.
Protegida da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.