

2609 – EQUITRAT 12X30G

CONCORRENTES: Vermífugo de largo espectro com ação larvicida e ovicida pronto para uso.

FÓRMULA:

Cada 100g contém:

Mebendazol... 20,0g

Veículo q.s.p.... 100,0g

INDICAÇÕES:

No controle e tratamento das endoparasitoses dos equinos, tais como: *Parascaris equorum*, grandes estrogilídeos, *Strongylus edentatus*, *Strongylus vulgaris*, *Strongylus equinus*, pequenos estrogilídeos, *Gyalocephalus spp.*, e também contra *Oxyrius equi* e *Probstmayria vivípara*.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

Abate: Deve ser realizado 20 dias após a última aplicação.

MODO DE USAR:

Calcular o peso do animal a ser tratado. Girar o anel de acordo com a graduação existente no êmbolo da seringa associando com o peso do animal a ser tratado. Introduzir a extremidade da seringa na boca do animal, e pressionar o êmbolo até a dosagem marcada pelo anel. Recomenda-se tratar animais adultos a cada 8 semanas e animais jovens a cada 6 semanas. Observar um período mínimo de 4 semanas entre um tratamento e outro.

POSOLOGIA:

Administrar 10mg de mebendazol por Kg de peso ou de acordo com a tabela abaixo:

Peso do animal 0 – 50kg – 2,5g de produto.

Peso do animal 50 – 100kg – 5,0g de produto.

Peso do animal até 100 – 200kg - 10g de produto.

Peso do animal até 200 – 300kg – 15,0g de produto.

Peso do animal até 300 – 400kg – 20,0g de produto.

Peso do animal até 400 – 500kg – 25,0g de produto.

Peso do animal até 500 – 600kg – 30,0g de produto.

PRECAUÇÕES E INSTRUÇÕES DE USO:

Em casos de infecções por *Anoplocephala spp.*, as doses acima devem ser dobradas e no caso do verme pulmonar *Dictyocaulus arnifieldi*, administrar 20mg/kg/dia durante 5 dias.

Recomenda-se tratar os animais adultos a cada 8 semanas e os jovens a cada 6 semanas.

Para alterações na posologia e modo de usar, consulte um médico veterinário.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não apresenta nenhuma contraindicação, podendo ser administrado em animais de qualquer sexo ou idade e fêmeas prenhes em qualquer estágio da gestação.