

3849 - ESTREPTOMICINA BIOFARM 12X6.25G

FÓRMULA:

Estreptomicina (sulfato)..... 6,25g
Diluyente: Água Bidestilada Estéril..... 20,0mL
Equivalente a 5,0g de estreptomicina base.

DESCRIÇÃO:

A ESTREPTOMICINA BIOFARM é um antibiótico aminoglicosídeo de amplo poder bactericida. Está indicado no controle e tratamento de infecções sistêmicas dos animais, com atividade principal contra bactérias gram-negativas e com atividade variável contra bactérias gram-positivas: garrotilho, pneumonia, leptospirose, salmonelose e mastite.

MODO DE USAR E POSOLOGIA:

Aplicar por via intramuscular, na dosagem de 1mL para cada 25Kg de peso corpóreo (10mg/Kg), independente da espécie animal, em intervalos de 12 horas, não devendo ultrapassar 7 dias.

Não interromper o tratamento com ESTREPTOMICINA BIOFARM por, no mínimo 48 horas após a melhora clínica, ou a critério do Médico Veterinário. Após dissolvida, ESTREPTOMICINA BIOFARM deve ser utilizada imediatamente ou conservada a temperatura de 4 graus, para uso posterior, até 24 horas após a sua diluição.

INDICAÇÕES:

ESPÉCIE ANIMAL	ENFERMIDADE	
	MICROORGANISMO	
Mastite	Pseudomonas aeruginosa	
Bovinos	Enterite	E. coli
Leptospirose	Leptospira spp.	

Equídeos	Pneumonia	Pasteurella multocida
Leptospirose	Leptospira spp.	

Suíños	Leptospirose	Leptospira spp.
Poliartrite Infecciosa	Haemophilus spp	

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS – ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 10 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO 3 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. NESTE PERÍODO, O LEITE DEVE SER DESCARTADO.

SUÍNOS – ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 30 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

EQUINOS - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 10 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO A ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar por via intravenosa.

Este produto não deve ser utilizado em animais com histórico de insuficiência renal.

Em animais sedados ou anestesiados, não é aconselhável a administração de ESTREPTOMICINA BIOFARM pois, este medicamento potencializa os efeitos dos anestésicos gerais.

O produto quando administrado por longos períodos pode acarretar lesão do nervo auditivo. A ototoxicidade é exacerbada pela administração simultânea de furosemida.

Pode ocorrer aumento de nefrotoxicidade quando aplicado concomitantemente a outros agentes potencialmente nefrotóxicos.

APRESENTAÇÃO:

Frasco contendo 6,25g, acompanha ampola de diluente com 20mL.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.