

4017 - VAC. SUPRAVAC10 50ML - 10DS

Vacina contra Rinotraqueíte Infecciosa, Diarreia Viral Bovina Tipo 1 e 2, Vírus Respiratório Sincicial, Parainfluenza, Leptospiroses e Pasteurelose Bovinas.

COMPOSIÇÃO:

É uma suspensão contendo vírus inativados por betapropiolactona de BVD- Diarreia Viral Bovina. Tipo 1 amostra citopática e não citopática, BVD Diarreia Viral Bovina. Tipo 2 amostra citopática, IBR – Rinotraqueite Infecciosa Bovina, BRSV – Vírus Respiratório Sincicial Bovino, P13 – Parainfluenza Bovina tipo 3 e bacterinas do cultivo de *Pasteurella haemolytica*, *Leptospiras Pomona*, *canicola*, *icterohaemorrhagiae*, *hardjo*, *wolffi* e *grippotyphosa*, mortos pelo formol e calor e adsorvidos pelo gel de hidróxido de alumínio como adjuvante.

INDICAÇÃO:

Na profilaxia das enfermidades respiratórias e reprodutivas bovinas causadas pelos vírus BVD (Diarreia Viral Bovina), IBR (Rinotraqueite Infecciosa Bovina), BRSV (Vírus Respiratório Sincial Bovino), P13 (Parainfluenza Bovina tipo 3), das bactérias *Pateurella Haemolytica*, *Leptospiras Pomona*, *canicola*, *icterohaemorrhagiao*, *wolffi* e *grippotyphosa*.

DOSES E MODO DE USAR:

Dose: 5ml via subcutânea. Em animais primovacinaos (animais não vacinados anteriormente): fazer uma dose e repetir a dose após 30 dias. Revacinar semestralmente com uma dose.

Bezerros: Fazer a primeira dose aos 4 meses e repetir a dose após 30 dias. Revacinar semestralmente com uma dose. A imunidade se efetivará 21 dias após a última revacinação.

CUIDADOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS:

Recomenda-se, para um melhor controle da sanidade do rebanho, testes diagnósticos para determinar quais agentes podem estar acometendo o rebanho quando houver desordens reprodutivas e respiratórias. Não vacinar animais doentes e debilitados. A vacinação de animais enfermos, subnutridos, com alta carga parasitária ou sob condições de estresse comprometem o desenvolvimento de uma resposta imunológica sólida e duradoura. Conservar a vacina em temperatura entre 2 e 8 graus, até o momento da aplicação. Não congele o produto. Verificar o prazo de validade do produto. Agitar vigorosamente o frasco antes e durante a aplicação da vacina. Desinfetar o local da aplicação da vacina e usar agulhas e seringas estéreis. O uso concomitante (ou nos dias que antecedem e sucedem a vacinação) com substâncias antimicrobianas ou anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação. Em caso de choque anafilático usar epinefrina ou equivalente. Recomenda-se que a vacinação seja efetuada após a comprovação laboratorial do complexo viral das enfermidades no rebanho.

Venda sob prescrição e uso sob orientação do Médico Veterinário. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não vacinar animais 21 dias antes do abate.