

## **4089 - FREE RAT RATICIDA ISCA PELETIZADO 40X25G (PC 1KG)**

### **FÓRMULA:**

Cada 25g contém:

Brodifacoum 3[3-(4 -bromobiphenyl -4-yl)-1,2,3,4- tetrahydro- 1- naphtyl] - 4 -

Hydroxycoumarin..... 0,005% P/P

Benzoato de denatonium..... 0,0035% P/P

Ativos e corantes

### **INFORMAÇÕES GERAIS:**

É um raticida anticoagulante de dose única, eficaz no combate aos ratos.

### **FARMACODINÂMICA:**

Inibem a formação, no fígado, dos fatores de coagulação. Os capilares são afetados, existindo hemorragias após traumas, vasodilatação e colapso circulatório.

### **INDICAÇÕES E ESPÉCIES:**

É indicado no combate aos ratos no meio ambiente.

### **MODO DE USO:**

Uso Oral. Os sachês não devem ser abertos, colocá-los tal como fornecidos onde os roedores vivem e transitam, como tocas, trilhas, túneis, etc. Aplicar aproximadamente 1 a 3 sachês em cada ponto de iscagem. Nas trilhas, os pontos devem estar distantes cerca de 5 metros um do outro. Não misture o produto com alimentos ou outras iscas. Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais. Recomenda-se colocar o produto em caixas porta-iscas, inacessíveis a espécies não-alvo. Não colocar o produto onde seja possível contaminação de alimentos. Os pontos de iscagem devem ser inspecionados diariamente por morador adulto, de forma a impedir exposição de crianças e animais domésticos no local até sua efetiva retirada. Além disso os pontos de iscagem também devem ser inspecionados para verificação do consumo e remanejamento das iscas, nos locais onde não foram consumidas. Para evitar o contato direto com o produto, usar luvas impermeáveis durante a aplicação.

### **DOSAGENS:**

A quantidade dos pontos de isca varia de acordo com o grau de infestação e com o tamanho da área a ser desratizada. Colocar um envelope (25g) em cada toca e em cada ponto de isca, numa distância de 5 a 10 metros entre si. Após 7 a 10 dias, inspecionar o local para avaliação de controle. Reaplicar nos locais onde houver consumo. Após o término da desratização, recolher as sobras.

### **EFEITOS COLATERAIS E PRECAUÇÕES:**

Cuidado! Perigoso se ingerido, inalado ou absorvido pela pele.

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

Durante o manuseio usar luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não comer, beber e nem fumar.

Não aplique sobre os alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.

Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar.

Em caso de intoxicação, procure o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.

Não reutilizar as embalagens vazias.

Manter o produto na embalagem original.

Em caso de contato direto em este produto, lave a parte atingida com água fria corrente e sabão.

Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente em abundância.

Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

Só utilizar em local de difícil acesso a crianças e animais.

Em caso de ingestão provoque o vômito.

Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente.

As mulheres grávidas não podem manipular rodenticidas

Conservar em local desratizado em perfeita condição de limpeza.

#### INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Cumarínico

Nome Comum: Brodifacoum

Antídoto: Vitamina K1

Telefone de Emergência: CIT (15) 5011-5111

Ramal: 250 a 254

Telefone SAC: (15) 3281-1880

E-mail: faleconosco@labgard.com.br

#### INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR REFERENTES A DESATIVAÇÃO E DESCARTE DA EMBALAGEM VAZIA:

Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos do agente tóxico (isca) e embalagens, envolvendo previamente, usando luvas e sacos de lixo. Não reutilizar embalagens vazias. Não se deve contaminar os cursos de água. Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes.

#### APRESENTAÇÃO:

Sachê contendo 25g. Conservar o produto ao abrigo da luz solar e a temperatura ambiente, entre 15°C e 30°C. Proteger o produto da umidade.