

## **4137 - TYLAN 200 LÍQUIDO 12X50ML**

### **FÓRMULA:**

Cada 100ml contém:

Tilosina Base (como Tilosina Intermediária)..... 20g

Veículo q.s.p..... 100ml

### **USO VETERINÁRIO:**

Antibiótico para uso em suínos e bovinos.

### **PROPRIEDADES:**

A tilosina é relativamente atóxica. Quando administrada por via oral em camundongos, a DL 50 é maior que 5 g por kg de peso. Em suínos, a DL 50 administrada por via intramuscular é aproximadamente 1.000 mg por kg de peso, por via oral, é maior que 5 g por kg de peso. Outros estudos em cães, gatos e suínos evidenciam ainda mais a segurança desse antibiótico. Estudos de níveis sanguíneos foram feitos em bovinos e suínos, comparando Tylan 200 líquido com soluções aquosas de tártaro de tilosina. Uma maior duração da atividade foi evidenciada com tylan 200 líquido.

A tilosina tem um espectro antibacteriano que é essencialmente gram-positivo, mas é também ativa contra certas espiroquetas, vírus grandes e certos microrganismos gram-negativos (excluindo os coliformes). É também ativa contra certas espécies de Mycoplasma.

### **INDICAÇÕES:**

Bovinos: Indicado para o tratamento de Pneumonia associada com *Pasteurella multocida* e *Corynebacterium pyogenes*, Metrite causada por *Corynebacterium pyogenes* e Mastite Aguda causada por *Streptococcus* spp e *Staphylococcus* spp.

Suínos: Indicado para o tratamento de Pneumonia causada por *Pasteurella multocida*, Erisipela causada por *Erysipelothrix insidiosa*.

### **ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:**

Bovinos: Abate: O abate dos animais tratados com este produto somente deve ser realizado 21 dias após a última aplicação.

Leite: O leite dos animais tratados com este produto não deve ser destinado ao consumo humano até 72 horas após a última aplicação deste produto.

Suínos: Abate: O abate dos animais tratados com este produto somente deve ser realizado 21 dias após a última aplicação.

Obs: A utilização do produto em condições diferentes das indicadas nesta bula pode causar a presença de resíduos do produto acima dos limites aprovados, tornando o alimento de origem animal impróprio para o consumo.

### **POSOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO:**

Bovinos: Injetar 0,5 a 1,0 ml para cada 20 kg de peso corporal ao dia, por via intramuscular. O tratamento deverá ser continuado pelo menos 24 horas após o desaparecimento dos sintomas da doença, não ultrapassando 5 dias. Não injetar mais que 10,0 ml por via intramuscular em casa local de aplicação.

Suínos: Injetar 0,5 a 1,0 ml para cada 20 kg de peso corporal ao dia, por via intramuscular. O tratamento deverá ser continuado pelo menos 24 horas após o

desaparecimento dos sintomas da doença, não ultrapassando 3 dias. Não injetar mais que 5,0 ml em cada local de aplicação.

#### PRECAUÇÕES E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Não misturar Tylan 200 líquido com outras soluções parenterais, pois podem causar a precipitação do ingrediente ativo. Quando for injetado em leitões recém-nascidos, usar equipamento adequado e ajustado para liberar a dose correta. Se não houver resposta ao tratamento em 5 dias, o diagnóstico ou o tratamento deverá ser reconsiderado.

#### EFEITOS COLATERAIS:

Efeitos colaterais, como edema da mucosa retal, protrusão anal, diarreia, eritema e prurido foram observados em alguns leitões após o uso da tilosina. A suspensão do tratamento permitiu a recuperação à reação.

#### APRESENTAÇÃO:

Frasco ampola contendo 50 ou 100ml.

- Conservar o produto em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar, a temperatura ambiente.
- Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Após aberto, utilizar em até 30 dias.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário.