

4176 - TRIGENTAL 24X40G

FÓRMULA:

A cada 100g contém:

Enrofloxacino..... 5,00g

Excipiente q.s.p..... 100,00g

INDICAÇÕES:

Para tratamento das enterites (diarreias):

Bovinos: Causadas por *Salmonella* spp e *Escherichia coli*.

Suínos: Causadas por *Salmonella* spp e *Escherichia coli*.

MODO DE USAR:

Via oral, diretamente sobre a língua dos animais.

Bovinos: 5 gramas de trigental para 100kg de peso, o que corresponde a 2,5 mg de enrofloxacino por kg de peso corpóreo.

Suínos: 5 gramas de trigental para 100kg de peso, o que corresponde a 2,5 mg de enrofloxacino por kg de peso corpóreo.

Essas doses devem ser aplicadas a cada 24 horas ou a critério do médico veterinário.

Não interromper o tratamento antes de decorridas, pelo menos, 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

Bovinos: Abate: O abate dos animais tratados com este produto somente deve ser realizado 7 dias após a última aplicação.

Bovinos: Leite: Este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para o consumo humano.

Suínos: Abate: O abate dos animais tratados com este produto somente deve ser realizado 7 dias após a última aplicação.

OBS: A utilização do produto em condições diferentes das indicadas nesta bula pode causar a presença de resíduos acima dos limites aprovados, tornando o alimento de origem animal impróprio para o consumo.

EFEITOS COLATERAIS:

Podem ocorrer urticária e prurido em animais hipersensíveis às quinolonas e erosões das cartilagens nos animais jovens em fase de crescimento.

Restrições: Não usar em bezerros destinados a vitelo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Não administrar o produto juntamente com medicamentos contendo magnésio, zinco, cálcio e ferro, pois eles reduzem a absorção das quinolonas. Não associar o uso do produto com alcalinizantes urinários (bicarbonato de sódio, citratos ou inibidores da anidrase carbônica), pois podem causar nefrotoxicidade, apesar de serem raras. Antagonismo com tetraciclina e sulfas + trimetoprim.

CONTRAINDICAÇÕES:

Na gestação, lactação e na insuficiência renal grave.

VALIDADE:

2 anos após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO:

Seringa plástica descartável dosadora contendo 40g.

Conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco, a temperatura ambiente (15 a 30 graus), ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.