

4218 - SOLUCEF PPU 12X100ML

FÓRMULA:

Cada 100ml contém:

Ceftiofur (Cloridrato)..... 5,00 g

Veículo q.s.p 100,0 ml

INDICAÇÕES:

Indicado nas seguintes espécies de animais:

Bovinos: Para o tratamento das pneumonias causadas por *Pasteurella multocida*, enterites causadas por *Salmonella Typhimurium*, *Escherichia coli*, podridão dos cascos causado por *Fusobacterium necrophorum* e mamites causadas por *Streptococcus dysgalactiae*.

Auxilia no controle e prevenção das infecções geniturinárias, pós-operatórias e pós-parto causadas por germes sensíveis ao ceftiofur.

Suínos: Para o tratamento das pneumonias causadas por *Pasteurella multocida* e *Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae*, enterites causadas por *Salmonella choleraesuis*, *Escherichia coli* e meningoencefalites causadas por *Streptococcus suis* tipo 2.

Auxilia no controle e prevenção das infecções geniturinárias, pós-operatórias e pós-parto causadas por germes sensíveis ao ceftiofur.

DOSAGEM E MODO DE USAR:

Bovinos: Administrar por via muscular profunda 1,0 a 2,0 mL/50 kg de peso, equivalente a 1,0 a 2,0 mg/kg de peso, repetir o tratamento com intervalos de 24 horas durante 3 dias seguidos. Não deve ser aplicado mais de 15 mL em um único ponto de aplicação.

Suínos: Administrar por via muscular profunda, de preferência na região do pescoço, 0,6 a 1,0 mL/10 kg de peso, equivalente a 3,0 a 5,0 mg/kg de peso, repetir o tratamento com intervalos de 24 horas durante 3 dias seguidos. Não deve ser aplicado mais de 10 mL em um único ponto de aplicação.

PERÍODO DE CARÊNCIA: ATENÇÃO OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

Bovinos: abate: o abate dos animais tratados com este produto somente deve ser realizado 03 dias após a última aplicação.

Leite: carência zero.

Suínos: abate: o abate dos animais tratados com este produto somente deve ser realizado 02 dias após a última aplicação.

OBS: A utilização do produto em condições diferentes das indicadas nesta bula pode causar a presença de resíduos acima dos limites aprovados, tornando o alimento de origem animal impróprio para o consumo.

PRECAUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO:

- Agite bem antes de usar o produto.

Não deverá ser utilizada subdosagem, sob pena de interferência na eficácia do tratamento.

- Não administrar o produto em animais com hipersensibilidade a droga e suspender a medicação.

- Penicilinas e cefalosporinicos podem causar reações alérgicas em indivíduos sensíveis.

- Não utilizar as embalagens vazias.

- Não utilizar o produto com prazo de validade vencido.

PRECAUÇÕES COM AS PESSOAS:

- Pessoas com histórico de reações a penicilina e cefalosporínicos devem evitar manusear o produto.
- Em caso de acidentes oculares, lavar bem os olhos com água corrente por 15 minutos.
- Em acidentes tópicos lavar bem a pele com água corrente e sabão.
- Retirar a roupa contaminada.
- Se ocorrer reações alérgicas, procurar o médico e levar a bula do produto.

PRAZO DE VALIDADE:

02 anos após a data de fabricação.

Após a primeira perfuração, o produto pode ser utilizado por até 60 dias.

APRESENTAÇÃO:

Frascos de vidro âmbar com 50 mL e 100 mL. Conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco, à temperatura ambiente (15 C a 30 C), ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.