

4353 - VAC. RESGUARD CARBUNCULO T/HB 90ML-30DS

COMPOSIÇÃO:

Vacina inativada, purificada e concentrada por ultrafiltração.

Apresentada na forma aquosa com adjuvante de hidróxido de alumínio.

- Anacultura de *Clostridium chauvoei*
- Anatoxina de *Clostridium perfringens* B
- Anatoxina de *Clostridium perfringens* D
- Anatoxina de *Clostridium septicum*
- Anatoxina de *Clostridium novyi*
- Anatoxina de *Clostridium sordellii*
- Anatoxina de *Clostridium haemolyticum*
- Anatoxina de *Clostridium tetani*

Obs.: A presença da Anatoxina de *Clostridium perfringens* tipo B confere proteção cruzada contra as Anatoxinas dos *Clostridium perfringens* tipo A e tipo C.

DESCRIÇÃO:

RESGUARD THB é uma vacina para prevenção das clostridioses, sua composição permite a proteção contra dez variedades de clostrídeos. A vacinação com RESGUARD THB protege os animais contra as seguintes doenças: Carbúnculo Sintomático, Edema Maligno, Doença do Rim Polposo, Enterotoxemia Hemorrágica, Enterotoxemia dos Bovinos Adultos, Hepatite Necrótica, Hemoglobínúria Bacilar e Tétano. Essa imunização permite que a RESGUARD THB gere proteção contra a Síndrome da Morte Súbita.

ESPÉCIES:

Bovinos, ovinos e caprinos.

MODO DE USAR:

Aplique o produto por via subcutânea na dose de 3 mL por animal.

Filhotes de mães recentemente vacinadas: 1a dose: aos 60 dias de idade.

2a dose: 4 semanas após a primeira dose. Posteriormente aplique uma dose anual.

Filhotes de mães não vacinadas: 1a dose: aos 15 dias de idade.

2a dose: 4 semanas após a primeira dose. Posteriormente aplique uma dose anual.

Fêmeas em gestação devem ser vacinadas um mês antes do parto (exceto cabras).

Em regiões com alta incidência de clostridioses recomenda-se a revacinação semestral ou a critério do Médico Veterinário.

OBS: Alterações no protocolo de primo vacinação ocorrem devido a interferência de anticorpos maternos transmitidos através do colostro.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

Abate: 21 dias após a última aplicação.

RECOMENDAÇÕES:

- Agitar antes e durante seu uso.
- Manter em temperatura de 2 a 8 graus.
- Não vacinar animais doentes, fracos ou estressados.
- Não vacinar cabras gestantes.
- Em caso de reação anafilática utilizar epinefrina ou equivalente.
- Manter este ou qualquer medicamento fora do alcance de crianças e animais domésticos.

– O uso concomitante da vacina com substâncias antimicrobianas ou antiinflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e na manutenção da resposta imune.