4421 - FURIUS 12X5000ML
4422 - FURIUS 12X1000ML

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Fention ..... 15,00 g
Fluazuron ..... 2,50 g
Veículo q.s.p. ..... 100,00 Ml

DESCRIÇÃO:
Carrapaticida, mosquicida e bernicida para bovinos a base de Fention E.

INDICAÇÕES:
Associação de dois princípios ativos que proporciona eficácia no tratamento e controle de infestações por carrapato (Rhipicephalus (Boophilus) microplus), berne (Dermatobia hominis) e no controle da mosca-dos-chifres (Haematobia irritans), que acometem os bovinos.
O Flurazuron é um regulador de crescimento de insetos pertencente a classe dos derivados de benzailfenilureia, uma classe de inibidores da síntese de quitina. Sua atividade interfere na síntese da quitina dos carrapatos, durante o ingurgitamento e eclosão, destinado ao controle de carrapatos em bovinos.
Trata-se de um fármaco extremamente seguro para bovinos, pois em quantidades muito baixas inibe a formação de quitina do R. (B) microplus, possivelmente por meio da inibição de enzimas específicas envolvidas no processo de mudas dos carrapatos. O Fention é um inseticida organofosforado que inibe a acetilcolinesterase, o que leva ao acúmulo de neurotransmissor acetilcolina em sinapses e superestimula os receptores colinérgicos pós-sinápticos com sinais consequentes de neurotoxidades e morte em níveis elevados de inibição.

FORMA DE APLICAÇÃO E DOSAGEM:
Furius é uma solução pronta para uso que deve ser administrado em dose única, por via tópica (pour on), na linha dorsal do animal, vertendo a dose conforme a dosagem no frasco dosador.
A dosagem recomendada é de 1ml para cada 10kg de peso vivo, obedecendo a tabela abaixo:

PESO CORPORAL (EM KG)	DOSE (EM ML)
100	10
200	20
300	30
400	40
500	50
Acima de 600	1ml / 10kg

Deve ser utilizado de acordo com o programa adotado no controle de ectoparasitas e critério do médico veterinário.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA
Bovinos: Abate – O abate dos animais tratados somente deve ser realizado 47 dias após a última aplicação.
Leite – Este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para o consumo humano.

Obs: A utilização do produto em condições diferentes das indicadas nesta bula pode causar a presença de resíduos do produto acima dos limites aprovados, tornando o alimento de origem animal, impróprio para o consumo humano.

CONTRA-INDICAAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO:
Não foram realizados estudos de segurança em animais com menos de 6 meses de idade e vacas prenhes e/ou lactantes.
O produto NÃO deve ser aplicado nos animais sob as seguintes situações:
- Animais exaustos, estressados, debilitados ou doentes.
- Animais com hipersensibilidade conhecida aos compostos do produto.
- Regiões com lesões de pele.
- Vacas produtoras de leite para consumo humano.
- Animais molhados ou quando estiver prestes a chover.
- Condições de alta temperatura ambiente (horas de calor intenso).
- Não administrar o produto contra o vento.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:
A utilização do produto simultaneamente a outros medicamentos a base de organofosforados e benzoilfeniluréia, deve ser avaliada e observada atentamente pelo médico veterinário, para prevenir a ocorrência de intoxicações.
Produtos que ativam os receptores colinérgicos e relaxantes musculares periféricos devem ser evitados quando se fizer uso de organofosforados.
Os tranquilizantes fenotiazínicos aumentam a toxidade dos organofosfatos.
A succinilcolina e outros agentes bloqueadores neuromusculares podem potencializar os efeitos nicotínicos dos organofosforados.

REAÇÕES ADVERSAS:
Contém princípios ativos com ampla margem de segurança para bovinos, assim, quando administrado da forma recomendada, não são esperados efeitos colaterais.
Entretanto, segundo relatos de literatura, os seguintes sinais podem aparecer em caso de intoxicação por organofosforados (classe a qual pertence o Fention): salivação, vômito, defecação, hipermobilidade do trato gastrointestinal, micção, bradicardia, hipotensão, bronco contrição e convulsões. O Fluazuron, segundo a literatura, pode levar, raramente, a apresentação de alterações hepáticas e sanguíneas.

PRECAUÇÕES:
- Manter a embalagem fechada.
- Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto.
- Por se tratar de um produto ectoparasiticida de uso tópico, preferir a aplicação em horas mais frescas do dia e sem a presença de chuva.
- Produto irritante para os olhos, pele e mucosa. Proteger a pele, os olhos e a boca, utilizando equipamentos de proteção individual durante o manuseio e aplicação do produto.
- Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem do produto.
- Não guardar ou aplicar o produto junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos.
- Lavar bem as mãos após o manuseio do produto.
- Não beber, comer ou fumar durante o manuseio e aplicação do produto.

- Conservar o produto a temperatura ambiente, entre 15 e 30 graus, em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme legislação vigente. Não contaminar coleções de água de qualquer natureza.