4424 - ALL ATACK 5000L
4425 - ALL ATACK 1000L

FÓRMULA:
Cada 100 ml contém:
Fluazuron.....3,00g
Abamectina……0,60g
Veículo q.s.p.……100 ml

INDICAÇÕES:
Indicado para uso pour on, em bovinos, no tratamento e controle estratégico dos carrapatos (Rhipicephalus (Boophilus) microplus). Além disso, combate bernes (larvas de Dermatobia hominis). Também é indicado para o tratamento de bovinos infectados por nematódeos gastrintestinais (Haemonchus placei, Cooperia punctata, Oesophagostomum radiatum e Trichostrongylus axei).
Nas provas oficiais realizadas a campo, o produto apresentou eficácia superior a 95% até o 84 dia, contra carrapatos (Rhipicephalus (Boophilus) microplus).

FARMACODINÂMICA:
O Fluazuron tem ação inseticida e acaricida e atua como inibidor de crescimento de carrapatos, agindo contra enzimas participantes na formulação de quitina. A Abamectina pertence ao grupo das Avermectinas, que atuam nos canais de íons cloro controlados pelo ácido glutamínico e ácido gama-aminobutírico (GABA), gerando hiperpolarização de células nervosas devido ao aumento da condução intracelular do neurotransmissor. Consequentemente, há paralisia e morte dos parasitas.

MODO DE USO E DOSAGEM:
É administrado por via pour on (tópica), com aplicações na linha dorsal dos bovinos (fio do lombo) da região da cruz até a inserção da cauda, na dosagem de 10ml para cada 100kg de peso vivo. Para a apresentação de 1000ml e 2000ml a aplicação é feita com o próprio frasco do produto que já vem devidamente graduado. É recomendado o uso de pistola dosadora para a apresentação de 5000ml.

PESO CORPORAL (EM KG)	DOSE (EM ML)
100	10
200	20
300	30
400	40
500	50

Para animais acima de 500kg de peso corporal, seguir o padrão da dose 1ml/10kg de peso vivo.
Produto para aplicação em dose única. Repetir a aplicação de acordo com a orientação do médico veterinário tendo por base a infestação apresentada nos animais.

ATENÇÃO – OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
Bovinos: Abate – O abate dos animais tratados somente deve ser realizado 66 dias após a última aplicação.
Leite – Este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para consumo humano.

OBS: A utilização do produto em condições diferentes das indicadas nesta bula pode causar a presença de resíduos do produto acima dos limites aprovados, tornando o alimento de origem animal impróprio para o consumo.

CONTRAINDICAÇÕES:
O produto NÃO deve ser aplicado nos animais sob as seguintes situações:
- Animais exaustos, estressados, debilitados ou doentes.
- Animais recém manejados.
- Bezerros com idade inferior a 16 semanas.
- Regiões com lesões de pele.
- Vacas produtoras de leite para o consumo humano.
- Animais que estiverem molhados ou quando estiver prestes a chover.
- Animais sujos de lama ou estrume no local indicado para a aplicação.
- Animais de outras espécies.
- Condições de alta temperatura ambiente (horas de calor intenso).

PRECAUÇÕES:
- Não guardar ou aplicar o produto junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos.
- Obedecer às dosagens recomendadas para o uso do produto.
- Não utilizar o produto com o prazo de validade vencido.
- Não fumar, comer ou beber quando estiver trabalhando com o produto.
- Não misturar com óleos e outros pesticidas.
- Após o trabalho com o produto, lavar bem as mãos e a parte exposta do corpo.
- Não contaminar rios e outros cursos de água.
- Se o produto atingir os olhos lavar com bastante água.
- Proteger a pele e os olhos utilizando para tanto de equipamentos de proteção individual, durante o manuseio e aplicação do produto.
- Após abertura, o produto deve ser utilizado em até 90 dias.
- Deve ser mantido em sua embalagem original.
- Não reutilizar embalagens vazias. O descarte deve ser realizado de acordo com a legislação vigente.

ADVERTÊNCIAS:
Nenhuma reação adversa é esperada quando utilizado nas doses indicadas. Reações individuais de hipersensibilidade podem ocorrer.

INTOXICAÇÃO E SUPERDOSAGEM NOS ANIMAIS:
Pode promover, nos casos de intoxicação por alta dosagem, depressão motora, aumento da taxa respiratória, tremores musculares, midríase e rigidez extensa. O tratamento deve ser sintomático. Não há antídoto.

INTOXICAÇÃO NO HOMEM:
Se ocorrer intoxicação acidental, proceder da seguinte maneira: Retirar as roupas contaminadas e lavar as partes atingidas do corpo, com água e sabão.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.