

4555 - FOSBION B12 12X100ML

FÓRMULA

Cada 100ml contém:

Butafosfan..... 10,000 g

Cianocobalamina (Vitamina B12).... 5000,000 µg

Veículo q.s.p..... 100,00 mL

INDICAÇÕES PRINCIPAIS:

FosBion B12 é uma solução injetável para bovinos à base de Butafosfan (fósforo orgânico) e Cianocobalamina (vitamina B12) indicada na suplementação e no tratamento de estados carenciais destes elementos. O produto é seguro em bezerros, em vacas gestantes e lactantes quando utilizado de acordo com as recomendações do fabricante.

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.

MODO DE USO E DOSAGEM:

O produto FosBion B12 deve ser administrado nas seguintes doses e vias de aplicação indicadas para as categorias apresentadas na tabela abaixo:

Bezerros – 5 a 12ml, intravenosa ou subcutânea.

Bovinos adultos – 5 a 25ml, intravenosa ou subcutânea.

Administrar o produto 1 vez/dia por 3 a 5 dias consecutivos ou a critério do médico-veterinário. Nas aplicações subcutâneas volumes superiores a 10 mL devem ser fracionados e administrados separadamente. FosBion B12 deve ser administrado utilizando seringa e agulha estéreis e descartáveis. Antes da aplicação, a região deve ser limpa, desinfetada e seca.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA BOVINOSO PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS TRATADOS.O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS.O USO OU APLICAÇÃO DESTES PRODUTO EM SERES HUMANOS CAUSA GRAVES RISCOS À SAÚDE.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Não misturar o FosBion B12 com ácido ascórbico (vitamina C) pois isso poderá acarretar a destruição da vitamina B12.

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO:

O produto não deve ser administrado em animais que apresentem hipersensibilidade aos componentes da formulação. Não misturar em um mesmo frasco ou seringa com outros medicamentos. Este produto não deve ser utilizado em animais com hiperfosfatemia. Use com cuidado em pacientes com insuficiência renal crônica.

ADVERTÊNCIAS:

Não foram realizados estudos de segurança em bezerros com menos que 20 dias de idade. Estudos de segurança realizados com o produto não contemplaram um período de tratamento superior a 14 dias. A exposição direta à luz solar ou a altas temperaturas poderá degradar o produto.

PRECAUÇÕES EM ANIMAIS:

Obedecer às dosagens indicadas para o uso do produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto. Utilizar agulhas e seringas estéreis e descartáveis e aplicar as boas práticas de assepsia. Em administrações consecutivas alternar os lados entre lado direito e esquerdo.

PRECAUÇÕES EM HUMANOS:

Durante a utilização do produto, proteger-se com luvas de borracha (luva nitrílica). Não manusear o produto com as mãos desprotegidas. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Não reutilizar as embalagens. Não misturar a outros produtos. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente. Não contaminar coleções de água de qualquer natureza.

REAÇÕES ADVERSAS:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer. Em caso de reação, procure imediatamente um médico-veterinário.

Conservar em local seco e fresco, em temperatura entre 15 e 30 graus, ao abrigo da luz solar intensa e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Após a abertura do frasco, utilizar o produto em até 06 (seis) meses. Neste período, manter o produto em condições adequadas de armazenamento e esterilidade. Guardar o produto dentro da sua embalagem original, protegendo-o da luz, e somente retirá-lo no momento do uso.