

4594 - ABAMIC 1% 500ML

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Abamectina.....1 g.

Veículo q.s.p..... 100 mL.

INDICAÇÕES:

ABAMIC é eficaz no controle e tratamento de nematóides gastrintestinais e pulmonares, e ectoparasitas dos bovinos. Possui largo espectro, ampla margem de segurança, como baixa dosagem e boa tolerância.

Nematóides gastrintestinais e pulmonares: Adultos e larvas (incluindo larvas inibidas ou hipobióticas)
de *Ostertagia* spp., *Haemonchus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Bunostomum* spp., *Oesophagostomum* spp., *Nematodirus* spp., *Strongyloides* spp., e *Dictyocaulus* spp.

Ectoparasitas:

Insetos: Larvas de *Dermatobia hominis*, *Hypoderma* spp., e *Cochliomya hominivorax*.
Piolhos: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurytarnus*, *Solenopotes capillatus*, *Damalinea bovis*.

Sarna: *Psoroptes bovis*, *Sarcoptes scabiei* va. *bovis*, *Chorioptes bovis*.

Carrapato: Ajuda no controle de *Boophilus microplus*.

Pode ser utilizado como preventivo de bicheiras na castração de bezerros.

DOSAGEM:

ABAMIC deve ser administrado na dose de 1 mL para cada 50 kg de peso corporal (equivalente a 200 mcg de Abamectina por kg de peso).

ADMINISTRAÇÃO:

ABAMIC pode ser administrado por via injetável subcutânea, sob a pele solta, na frente ou atrás da escápula. Pode ser administrado de forma simultânea com outros injetáveis tais como a vacina contra Clostridiose, Brucelose, etc.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

Bovinos: Abate: O abate dos animais tratados com este produto só deve ser realizado 24 dias após a última aplicação.

Leite: Este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para o consumo humano.

NÃO TRATAR ANIMAIS DE MENOS DE 16 SEMANAS DE IDADE.

CLASSE TERAPÊUTICA:

Endectocidas (ação em endoparasitas e ectoparasitas) (anti-parasitários).

Conservar o produto, em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance das crianças e animais domésticos.