

## 961 - OUROTETRA PLUS LA 24X50ML

### FÓRMULA:

Cada 100 ml contém:

Oxitetraciclina (dihidrato).....20,00 g

Diclofenaco de sódio.....1,00 g

Veículo q.s.p..... 100,00 ml

### INDICAÇÕES:

Ourotetra Plus L.A. é um produto injetável à base de Oxitetraciclina associada ao Diclofenaco, de formulação Longa Ação, que proporciona uma sustentada absorção de seus ativos no local de aplicação e a permanência dos mesmos na corrente sangüínea por um período de 3 a 4 dias.

Ourotetra Plus L.A. combate a infecção, a dor, a febre e a inflamação com rapidez e praticidade, possibilitando uma melhora mais rápida do animal. É uma opção no tratamento de infecções respiratórias e digestivas de bovinos, suínos, caprinos e ovinos (pneumoenterites); na profilaxia e tratamento da infecção e da inflamação no pré e pós-operatório (castrações, descornas); no pós-parto, ou ainda em infecções locais como pododermatites (frieira infeccionada).

### INDICAÇÕES PARA BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS:

Anaplasmoses Anaplasma spp; Leptospirose Leptospira spp; Podridão do casco Fusobacterium necrophorum, Bacteroides nodosus; Ceratoconjuntivite Moraxella spp, Mycoplasma spp, Neisseria ovis; Actinobacilose Actinobacillus spp; Síndrome e febre dos transportes Pasteurella spp, Haemophilus spp; Pneumoenterites e diarreias Escherichia coli, Salmonella spp, Clostridium spp; Pneumonias Pasteurella spp, Haemophilus spp e Mycoplasma spp; Difteria dos bezerros Fusobacterium necrophorum; Metrite Escherichia coli, Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Corynebacterium spp; Mastite Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Mycoplasma spp, Escherichia coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Corynebacterium spp; Onfaloflebites e feridas infectadas Staphylococcus spp, Streptococcus spp e Corynebacterium spp; Dermatofilose Dermatophilus congolensis; Carbúnculo sintomático Clostridium chauvoei; Edema maligno Clostridium septicum; Tétano Clostridium tetani.

### INDICAÇÕES PARA SUÍNOS:

Pneumonia Pasteurella spp, Haemophilus spp, Mycoplasma spp; Leptospirose Leptospira spp; Erisipela Erysipelothrix spp; Diarreia dos leitões Salmonella spp, Streptococcus spp, Clostridium spp, Escherichia coli; Rinite atrófica Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida; Artrite infecciosa Haemophilus spp, Mycoplasma spp, Streptococcus spp, Escherichia coli, Pasteurella spp, Moraxella spp; Metrite, mastite, cistite Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Corynebacterium spp; Feridas infecciosas Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Escherichia coli e Corynebacterium spp.

### MODO DE USO E DOSAGEM:

Administrar 1 ml para cada 10 kg de peso corporal (20 mg de Oxitetraciclina e 1,0 mg de Diclofenaco por kg de peso corporal) pelas vias intramuscular profunda ou subcutânea em bovinos, ovinos e caprinos; e apenas pela via intramuscular profunda em suínos. Deve-se respeitar o volume máximo por local de aplicação de 10 ml para bovinos adultos e 5 ml para bezerros, suínos, ovinos e caprinos.

Pode ser utilizada a via intravenosa lenta com aplicações diárias de 1 ml para cada 20 kg de peso corporal (10 mg de Oxitetraciclina e 0,5 mg de Diclofenaco por kg de peso corporal).

#### DURAÇÃO DO TRATAMENTO:

Quando utilizadas as vias intramuscular e subcutânea, geralmente uma única aplicação é suficiente, podendo, em casos severos, ser necessária uma segunda aplicação 3 dias após a primeira.

Nas aplicações intravenosas, recomenda-se a continuidade do tratamento até 48 h após a remissão dos sintomas desde que não ultrapasse o período máximo de 4 dias consecutivos.

#### ADMINISTRAÇÃO:

Administrar 1 ml para cada 10 kg de peso corporal (20 mg de Oxitetraciclina e 1,0 mg de Diclofenaco por kg de peso corporal) pelas vias intramuscular profunda ou subcutânea em bovinos, ovinos e caprinos; e apenas pela via intramuscular profunda em suínos.

Deve-se respeitar o volume máximo por local de aplicação de 10 ml para bovinos adultos e 5 ml para bezerros, suínos, ovinos e caprinos.

Pode ser utilizada a via intravenosa lenta com aplicações diárias de 1 ml para cada 20 kg de peso corporal (10 mg de Oxitetraciclina e 0,5 mg de Diclofenaco por kg de peso corporal).

#### CONTRA-INDICAÇÃO E LIMITAÇÃO DE USO:

Não administrar o produto com prazo de validade vencido.

Não administrar o produto em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer uma das drogas presentes na composição.

Não administrar em animais com ulcerações gástricas e/ou intestinais ou portadores de disfunção renal.

Interações medicamentosas:

Não administrar a animais que estejam recebendo tratamento com barbitúricos ou fenitoína.

A absorção da oxitetraciclina pode ser afetada na presença de hidróxido de alumínio, bicarbonato de sódio, sais de cálcio e de magnésio e preparações de ferro.

A interação com sais de cálcio pode inibir o crescimento dos ossos e o desenvolvimento dos dentes, portanto deve-se evitar o uso deste medicamento em animais em fase de crescimento.

Não é recomendada a administração do produto concomitante a qualquer outro antiinflamatório esteróide ou não esteróide.

#### EFEITOS ADVERSOS:

Devido à capacidade que a oxitetraciclina tem de ligar-se ao cálcio, pode provocar arritmias cardíacas.

Em tratamentos prolongados podem ocorrer ulcerações na mucosa do estômago ou intestino, ou ainda, exantema cutâneo, edemas e, raramente, depressão da função renal.

#### PRECAUÇÕES:

Obedecer às dosagens indicadas para o uso do produto.

Somente o médico veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens recomendadas para o uso do produto.

Se houver disfunção renal, as doses devem ser reduzidas, para evitar acúmulo sistêmico excessivo.

**PERÍODO DE CARÊNCIA::**

Não destinar os animais ao abate antes de decorridos 34 dias após a última aplicação do produto.

Não destinar ao consumo humano o leite de animais tratados antes de decorridos 22 dias após a última aplicação do produto.

Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário.

**APRESENTAÇÃO:**

Frascos-ampola com 20 ml, 50 ml, 100 ml e 250 ml.

**CLASSE TERAPÊUTICA:**

ANTIMICROBIANOS GERAIS; ANTIFÚNGICOS E ANTIPROTOZOÁRIOS  
(COCCÍDIOS, FLAGELADOS)

**PRINCÍPIO(S) ATIVO(S):**

OXITETRACICLINA

DICLOFENACO