

2695 TIGUVON 24X150ML

COMPOSIÇÃO:

Fentione	15 g
Veículo q.s.p.	100 mL

INDICAÇÕES:

Tiguvon® 15 Spot-on® é um bernicida, mosquicida, piolhicide e larvicida sistêmico pronto para uso, especialmente indicado para grandes rebanhos. É rapidamente absorvido pela pele, distribuindo-se através da corrente sanguínea por todo o corpo do animal, eliminando bernes, moscas, piolhos e bicheiras.

MODO DE USAR E DOSAGENS:

Recomenda-se a aplicação de apenas com sua embalagem autodosadora, derramando-se a dose em um só ponto sobre a pele do animal, preferencialmente na região da cruz. Não se deve aplicar ao longo de todo o dorso do animal.

Contra bernes e bicheiras:

Peso vivo (kg)	Volume dose (mL)
100	7
101 - 150	10
151 - 200	15
201 - 250	20
251 - 320	25
321 - 400	32 (25 + 7)
401 - 500	40
acima de 500	50

Contra moscas:

Mosca do chifre (*Haematobia irritans*) e mosca dos estábulos (*Stomoxys calcitrans*), a dose é de 7 mL para cada 100 kg de peso. Recomenda-se repetir o tratamento a cada 3-4 semanas, até se obter uma drástica diminuição na reinfestação.

Contra piolhos:

Damalinia bovis, Haematopinus spp., Linognathus spp. e Solenopotes capillatus, use metade da dose para bernes. Nas grandes infestações, é necessária a repetição do tratamento 2 a 3 semanas após.

PRECAUÇÕES:

- Agite o produto antes de iniciar o uso.
- Não dosifique bezerros com idade inferior a 6 meses ou com menos de 100 kg de peso.
- Para prevenir erros, não dosifique as vacas amamentando e seus bezerros, ao mesmo tempo. Mantenha um intervalo de 3 dias, para esses casos.
- Não trate animais fracos, doentes, com fasciolose e/ou outros problemas de fígado.

- A ação do produto sobre os bernes é lenta. O resultado é melhor visto entre o 4º e o 9º dia após a aplicação.
- Não repita o tratamento em intervalos menores que 14 dias. Os bernes normalmente são controlados com tratamentos a cada 4 ou 7 semanas.
- Não aplique em animais molhados.
- Chuvas após a aplicação não prejudicam a ação do produto. Não repita o tratamento por esse motivo.
- Não use o produto associado ou junto com outros inseticidas fosforados, carbamatos ou quaisquer inibidores da colinesterase.
- Use sempre luvas ao manusear o produto.

As precauções abaixo são válidas para todo e qualquer ectoparasiticida.

- Prenda as aves domésticas quando da aplicação do produto e evite que elas se aproximem de animais que estão eliminando bernes. Tal medida impede que elas comam os parasitas e se intoxiquem.
- Para prevenir eventuais efeitos do produto sobre aves silvestres: anuns, gaviões, etc., que ingerem bernes, recomenda-se tratar os animais quando as infestações atingirem níveis médios. Evita-se assim "superoferta" temporária de bernes para as aves, muitas vezes famintas, como ocorre logo depois do tratamento de animais superinfestados.
- Animais que eventualmente morrerem em consequência de intoxicação por inseticida devem ser enterrados para evitar morte de aves de rapina.

CARÊNCIA:

Em gado de corte obedeça a um intervalo de 28 dias entre o tratamento e o abate dos animais para consumo humano. Em vacas leiteiras observe um intervalo de 5 dias entre o tratamento e o uso do leite para consumo humano.

CUIDADOS:

Conserve o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não use a embalagem vazia. Queime-a ou enterre-a após o uso. Não a lance em fontes de água. Não guarde ou aplique junto de fogo, alimentos ou calor excessivo. Não fume ou coma durante a aplicação ou manuseio. Lave bem, com água e sabão, as partes do corpo que entrarem em contato com o produto. Lave as mãos e o rosto após o término da aplicação.

INTOXICAÇÕES DEVEM SER TRATADAS DA SEGUINTE MANEIRA:

Animais: Injetar por via subcutânea ou intramuscular solução de atropina a 1% na dose de 3 a 10 mL, conforme o tamanho do animal. É recomendável associar reativadores da colinesterase.

Homens: Chamar o Médico.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.