

Fórmula: Cada 100 mL contém:

Gluconato de cálcio	20,00 g
Cloreto de magnésio hidratado	1,80 g
Hipofosfito de sódio	3,10 g
Dextrose	10,00 g
Veículo q.s.p.	100,00 mL

Indicações: **Cálcio Reforçado** é indicado para bovinos, equinos e ovinos para a suplementação dos minerais cálcio, fósforo e magnésio, na prevenção e/ou tratamento de estados carenciais.

Modo de uso e dosagens: **Cálcio Reforçado** pode ser aplicado pelas vias intravenosa lenta, e subcutânea, obedecendo às dosagens abaixo:
 Bovinos e equinos acima de 02 anos: 100 a 250 mL por via intravenosa lenta.
 Ovinos acima de 01 ano: 50 a 100 mL por via intravenosa lenta.
 Em bovinos pode ser utilizada a via subcutânea dividindo-se a dose em dois pontos de aplicação.
 As dosagens poderão ser modificadas, a critério do médico veterinário.

Contraindicações e limitações de uso: O produto não deve ser aplicado em animais com bloqueio cardíaco, lesão miocárdica ou insuficiência renal grave.
 A suplementação parenteral de cálcio associada ao potássio pode aumentar as chances de arritmias cardíacas, devendo ser realizada com cautela.
 Não administrar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes do produto.

Precauções: Utilizar equipo próprio para aplicação intravenosa bem lenta. Aplicação intravenosa muito rápida pode causar hipotensão, arritmias e parada cardíaca.
 O produto não deve ser aplicado em animais com bloqueio cardíaco, lesão miocárdica ou insuficiência renal grave.
 Pode causar hipercalcemia em animais com doenças cardíacas e renais.
 A exposição direta à luz solar ou a altas temperaturas poderá degradar o produto.



Cálcio Reforçado

Uso Veterinário

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEQUENTES PERÍODOS DE CARENÇA
 O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARENÇA PARA O ABATE DE BOVINOS, EQUINOS E OVINOS TRATADOS.
 O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARENÇA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS E OVINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE RÓTULO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA O CONSUMO.

Conteúdo: 200 mL

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Somente o médico veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto.

Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

Reações adversas: O produto quando usado nas dosagens e vias de administração indicadas não provoca reações adversas.

Interações Medicamentosas: Não associar com medicamentos que produzam depressão do sistema nervoso central. Não utilizar cálcio em tratamentos concomitantes com digitálicos. Antibióticos aminoglicosídeos por via intravenosa aumentam a excreção de cálcio. Diuréticos furosemida e ácido etacrínico inibidores da reabsorção de cloretos na alça de Henle aumentam a excreção de cálcio. Diuréticos tiazidas e amilorida (inibidores da reabsorção de sódio nos túbulos distais) aumentam a reabsorção de cálcio. Anti-inflamatórios (inibidores da síntese de prostaglandinas) aumentam a reabsorção tubular de cálcio e magnésio.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário. Conservar em local seco e fresco, em temperatura entre 15 e 30°C, ao abrigo da luz solar intensa e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.643 em 13/12/2011.

Responsável Técnica: Dra. Sandra Barioni Toma CRMV/SP 14.817

Apresentação: Frascos com 200 mL.

PARTIDA, FABRICAÇÃO E VENCIMENTO: vide área superior do frasco.

Proprietário e Fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
 Rod. Anhanquera SP 330 km 298
 CEP: 14140 000 Cravinhos SP
 Tel/Fax: 16 3518 2025
 CNPJ: 57.624.462/0001-05
 www.ourofino.com
 Indústria Brasileira



7 18 9 8 0 1 9 1 8 6 0 7 3 8 1

55001536/0714-0701

3100042/0714-0701