

# Corta Curso®

## Uso Veterinário

### Antidiarreico de largo espectro

#### Informações gerais:

A doxiciclina é um antibiótico da família das tetraciclina, com algumas particularidades que a diferenciam das outras moléculas congêneres. Com meia-vida plasmática prolongada, de aproximadamente 18 a 24 horas, necessita, portanto de dosagens diárias menores que outras tetraciclina. Possui excelente distribuição e penetração na maioria dos líquidos e tecidos orgânicos. Apresenta o mais alto grau de lipossolubilidade entre todas as tetraciclina, o que facilita a penetração direta da droga ativa, através da dupla camada lipídica dos agentes infecciosos, atingindo inclusive algumas cepas resistentes a outras tetraciclina. Atua inibindo a síntese proteica dos agentes etiológicos sensíveis. A doxiciclina não se acumula significativamente na circulação de animais com insuficiência renal. Por conseguinte, constitui a mais segura das tetraciclina no tratamento de infecções extra-renais nesses animais. A doxiciclina é excretada nas fezes, em grande parte como conjugado inativo, ou talvez, como quelato; por esse motivo, seu impacto sobre a microflora intestinal é relativamente menor. O Benzetimide inibe lenta mas fortemente a ação da acetilcolina, resultando em uma diminuição do tônus e da motilidade do trato gastrointestinal bem como uma redução de sua atividade secretora.

#### Fórmula:

Cada 100 mL contém:  
Hiclato de doxiciclina ..... 4,520 g\*  
Benzetimide cloridrato ..... 0,0165 g  
Veículo q.s.p. .... 100,000 mL

\*Equivalente a 4,00 g de doxiciclina base

#### Indicações:

**Corta Curso®** é indicado para o tratamento de enfermidades que acometem os bovinos, ovinos e caprinos, causadas pelos seguintes agentes etiológicos:

#### Para bovinos, ovinos e caprinos:

Diarreias: (*Escherichia coli*, *Salmonella* spp).  
Anaplasmose: (*Anaplasma* spp).  
Leptospirose: (*Leptospira* spp).  
Pododermatite: (*Fusobacterium* spp, *Staphylococcus* spp).

#### Modo de uso e dosagens:

**Corta Curso®** deve ser administrado pela via intramuscular, na dosagem de 1 mL para cada 10 kg de peso corporal, ou seja, 4 mg de doxiciclina e 0,0165 mg de benzetimide por kg de peso corporal. Se necessário repetir o tratamento 24 horas após a primeira injeção. Recomendamos não ultrapassar 3 dias de tratamento contínuo.

#### Precauções:

- Obedeça às dosagens indicadas para o uso do produto.

- Doses maiores que 10 mL devem ser divididas em dois ou mais pontos de aplicação.

- Somente o médico veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens recomendadas para o uso do produto.  
- Retirar o produto do frasco sob condições de assepsia, tomando o cuidado de não introduzir substâncias estranhas no frasco multídose.

#### Interações medicamentosas:

- Não administrar a animais que estejam recebendo tratamento com barbitúricos ou fenitoína.  
- A interação com sais de cálcio pode inibir o crescimento dos ossos e desenvolvimento dos dentes.  
- O benzetimide não pode ser associado à atropina e similares.

#### ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

**BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS**  
**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 14 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 05 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA O CONSUMO.**

#### Efeitos adversos:

Reações de natureza alérgica ou anafilática são raras, mas podem ocorrer

em animais hipersensíveis e são caracterizadas por sinais como inquietação, pelo arrepiado, tremores musculares, defecação e micção difícil, olhar vidrado e erupções na pele. Devido à capacidade que a doxiciclina tem de se ligar com o cálcio, pode provocar arritmias cardíacas. Fezes secas, apatia e ligeiro meteorismo podem aparecer em alguns animais.

#### Contraindicações e limitações de uso:

- Não administrar a equinos.  
- Não administrar o produto com prazo de validade vencido.  
- Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário.

#### Responsável Técnica:

Sandra Barioni Toma – CRMV/SP 14.817

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6.682 em 13/01/1.999.

#### Apresentação

Frasco-ampola de vidro âmbar contendo 20 ou 50 mL.

**ourofino**  
saúde animal

Proprietário e fabricante:  
**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330 KM 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
Tel/Fax: 16 3518 2025  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
www.ourofino.com  
Indústria brasileira

100% brasileira, exportadora,  
gerando empregos no Brasil.



5000017271213 09/00