

Diclofenaco 50

Uso Veterinário

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Diclofenaco sódico 5,00 g
Veículo q.s.p. 100,00 mL

Indicações:

Diclofenaco 50 é um potente analgésico, não narcótico, não esteroide, com atividade anti-inflamatória e antipirética, recomendado para todos os casos de dor, febre e/ou inflamação.

Modo de uso e dosagens:

Diclofenaco 50 deve ser administrado pelas vias intramuscular, intravenosa ou subcutânea, na dosagem de 1 mg/kg, ou seja, 1 mL para cada 50 kg de peso corporal, conforme tabela abaixo:

Peso (kg)	Dose (mL)
50 kg	1 mL
100 kg	2 mL
200 kg	4 mL
300 kg	6 mL
400 kg	8 mL
500 kg	10 mL

1 mL a cada 50 kg

Uso em bovinos:

Diarreia dos recém-nascidos:

1 mL de **Diclofenaco 50** para cada 50 kg de peso corpóreo. Geralmente uma única injeção é efetiva.

Na mastite aguda:

1 mL de **Diclofenaco 50** para cada 50 kg de peso corpóreo, por via intravenosa. Continuar o tratamento por 3 a 5 dias.

Desordens músculo-esqueléticas:

1 mL de **Diclofenaco 50** para cada 50 kg de

peso corpóreo, por via intravenosa ou intramuscular. O tratamento pode ser repetido durante 5 dias consecutivos.

Outras indicações:

Paresia pós-parto (Vaca caída).
Tratamento auxiliar em infecções agudas, para reduzir a febre e estimular o apetite.
Tratamento da dor aguda causada por cirurgia e feridas.
1 mL de **Diclofenaco 50** para cada 50 kg de peso corpóreo por dia.

Uso em suínos:

Síndrome Metrite-Mastite-Agalaxia (M.M.A.):

1 mL de **Diclofenaco 50** para cada 50 kg de peso corpóreo por dia. O tratamento poderá ser repetido por 3 a 5 dias.

Inflamações do aparelho locomotor:

1 mL de **Diclofenaco 50** para cada 50 kg de peso corpóreo por dia.
O tratamento poderá ser repetido por 3 a 5 dias.

As dosagens e os intervalos entre os tratamentos poderão ser alterados a critério do Médico Veterinário.

Precauções:

- Obedecer às dosagens indicadas para a aplicação do produto.
- Utilizar agulhas e seringas esterilizadas, observando as boas práticas de assepsia.
- É importante, durante o tratamento com o diclofenaco, o acompanhamento cuidadoso em animais portadores de sintomas indicativos de distúrbios gastrintestinais, com histórico que sugira ulceração gástrica ou intestinal.

Contraindicações e limitações de uso:

Não administrar o diclofenaco em animais com ulcerações gástricas e ou intestinais. O diclofenaco é contraindicado para animais que apresentam hipersensibilidade à droga. Não administrar o produto a animais com grave problema de disfunção renal.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 10 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 03 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTA PRODUTO.

SUÍNOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 10 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Interações medicamentosas:

A administração concomitante com outros anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) ou glicocorticoides pode resultar numa somatória das ações farmacológicas. Embora as investigações clínicas não pareçam indicar, existem relatos de elevação do risco de hemorragias com o uso concomitante de diclofenaco e anticoagulantes. Nesses casos, é recomendável uma monitoração do animal a ser tratado.

Efeitos adversos:

Há relatos de ulceração estomacal e da mucosa intestinal, em tratamentos muito prolongados. Pode ocorrer exantema cutâneo, edemas e, raramente, depressão da função renal, em tratamentos prolongados.

- Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, entre 15°C a 30°C, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 7.128 em 19/10/99.

Responsável Técnica:

Sandra Barioni Toma CRMV/SP 14.817

Apresentação:

Frasco-ampola de vidro âmbar com 50 mL



Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 KM 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.com
Indústria brasileira

**100% brasileira, exportadora,
gerando empregos no Brasil.**

