

Fortemil®

Uso Veterinário

Solução Injetável

Fórmula:

Cada 500 mL contém:

Riboflavina (Vitamina B ₂)	20,0 mg
Cloridrato de piridoxina (Vitamina B ₆)	15,0 mg
Nicotinamida	1.000,0 mg
Acetil d-l-metionina	660,0 mg
Cloreto de sódio	3.500,0 mg
Cloreto de potássio	250,0 mg
Cloreto de cálcio	150,0 mg
Cloreto de magnésio	90,0 mg
Dextrose	25.000,0 mg
Veículo q.s.p.	500,0 mL

Cada ampola de 3 mL contém:

Vitamina B ₁₂	10.000,0 µg
Veículo q.s.p.	3,0 mL

Indicações:

Fortemil® é indicado para bovinos, ovinos, equinos e suínos, no tratamento de esgotamento físico por excesso de trabalho ou de produção. Anorexias, caquexias e desidratações.

Indicado ainda como adjuvante no tratamento das verminoses e das doenças infecciosas, como anaplasmoses e piroplasmose.

Após intervenções cirúrgicas, hemorragias prolongadas, neuropatias e acetonecias.

Modo de uso:

Fortemil® deve ser administrado pela via intravenosa utilizando-se equipo apropriado para a aplicação de soro. Também poderá ser aplicado pelas vias subcutânea ou intraperitoneal. A ampola de vitamina B₁₂ deve ser adicionada ao frasco de soro, imediatamente antes da sua aplicação.

Dosagens:

Animais	Classe	Peso	Doses
Grande Porte	Bovinos e equinos adultos	400 a 800 kg	1 a 2 L
Médio Porte	Bovinos e equinos jovens, ovinos e suínos adultos	200 a 400 kg	500 mL
Pequeno Porte	Ovinos e suínos jovens	50 a 200 kg	20 mL a 100 mL

As dosagens poderão ser alteradas a critério do médico veterinário.

Aplicar por via intravenosa através de equipo apropriado, esterilizado.

Antes da aplicação, adicionar ao frasco a ampola de vitamina B₁₂ que acompanha o produto.

Precauções:

- Guardar o produto dentro da sua embalagem original, protegendo-o da luz, e somente retirá-lo no momento do uso.
- Quando **Fortemil®** for associado com cálcio injetável por via intravenosa, a administração deve ser muito lenta.
- Somente adicionar a ampola de vitamina B₁₂ no momento do uso.
- A aplicação intravenosa deve ser feita lentamente, sempre utilizando o equipo esterilizado que acompanha o produto.

Contraindicações e efeitos colaterais:

- O produto não é indicado para animais que tenham apresentado qualquer reação alérgica aos componentes da formulação.
- O produto não apresenta efeitos colaterais quando utilizado corretamente.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS E OVINOS

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS E OVINOS TRATADOS. O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS E OVINOS TRATADOS.

EQUÍDEOS (*Equus caballus*/CAVALOS) E SUÍNOS

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE EQUINOS E SUÍNOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Interações medicamentosas:

- Evitar o uso simultâneo de cloranfenicol com a Piridoxina ou com a Vitamina B₁₂, pois poderá causar um efeito antagônico entre os mesmos.
- Evitar o uso simultâneo de Ácido Ascórbico com a Vitamina B₁₂, pois isso poderá acarretar a destruição da Vitamina B₁₂.
- Conservar em local seco e fresco, entre 15°C a 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6.479 em 22/07/98.

Responsável Técnica: Sandra Barioni Toma CRMV/SP 14.817

Fortemil

Uso Veterinario

Solución Inyectable

Composición:

Cada 500,0 ml contiene:

Riboflavina (Vitamina B ₂)	20,0 mg
Cloridrato de piridoxina (Vitamina B ₆)	15,0 mg
Nicotinamida	1.000,0 mg
Acetil d-l- metionina	660,0 mg
Cloruro de sodio	3.500,0 mg
Cloruro de potasio	250,0 mg
Cloruro de calcio	150,0 mg
Cloruro de magnesio	90,0 mg
Dextrosa	25.000,0 mg
Excipientes c.s.p.	500,0 ml

Cada ampolla de 3,0 ml contiene:

Vitamina B ₁₂	10.000,0 µg
Excipientes c.s.p.	3,0 ml

Indicações:

Fortemil es indicado para bovinos, ovinos, equinos y porcinos, en el tratamiento de agotamiento físico por exceso de trabajo, anorexia, caquexia y deshidratación. Además, **Fortemil** es indicado como adyuvante en el tratamiento de las enfermedades parasitarias e infecciosas, post-cirugías, hemorragias prolongadas, neuropatías, y acetonecia.

Modo de administración:

Fortemil debe ser administrado por vía intravenosa, utilizando equipo apropiado para la aplicación del suero, y también podrá ser aplicado por vía subcutánea o intraperitoneal. La ampolla de vitamina B₁₂ debe ser adicionada al frasco de suero inmediatamente antes de la aplicación.

Dosis:

Animales	Clase	Peso	Dosis
Porte grande	Bovinos y equinos adultos	400 a 800 kg	1 a 2 L
Porte medio	Bovinos y equinos jóvenes ovinos y cerdos adultos	200 a 400 kg	500 mL
Porte pequeño	Ovinos y cerdos jóvenes	50 a 200 kg	20 mL a 100 mL

Las dosis podrán ser cambiadas a criterio del médico veterinario. Administrar por vía intravenosa utilizando el equipo apropiado estéril. Antes de la aplicación, añadir al frasco la ampolla de la vitamina B₁₂ que acompaña el producto.

Precauciones:

- Mantener el producto dentro del embalaje

original, protegiéndolo de la luz, y solamente sacarlo en el momento de la utilización.

- Cuando **Fortemil** es asociado al calcio inyectable por vía intravenosa, su administración debe ser muy lenta.

- Solamente adicionar la ampolla de vitamina B₁₂ en el momento del uso.

- La aplicación intravenosa debe ser hecha lentamente, siempre utilizando el equipo que acompaña el producto.

Contra indicaciones y reacciones adversas:

- El producto no está indicado para animales que hayan presentado alguna reacción alérgica a los componentes de la composición.

- El producto no presenta efectos secundarios si se utiliza correctamente.

Tiempo de retiro: No aplica

Interacciones medicamentosas:

- Evitar el uso simultáneo del Cloranfenicol con la piridoxina o con la Vitamina B₁₂, puesto que podrá causar un efecto antagónico entre los mismos.

- Evitar el uso simultáneo del Ácido Ascórbico con la Vitamina B₁₂, puesto que podrá acarrear la destrucción de la Vitamina B₁₂.

Condiciones de almacenamiento y conservación:

- Conservarlo en lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C protegido de la luz solar, mantenerlo fuera del alcance de niños y animales domésticos.

Consulte al Médico Veterinario.

Responsable Técnica:

Sandra Barioni Toma CRMV/SP 14.817
Médica Veterinaria



Proprietário e fabricante/Fabricado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 KM 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.com
Indústria brasileira/Hecho en Brasil