

# Gentrin® Infusão Uterina

## Uso Veterinário

### Fórmula:

Cada 100 mL contém:  
Gentamicina base  
(como sulfato) ..... 300,00 mg  
Cloridrato de  
bromexina ..... 150,00 mg  
Cloreto de  
benzalcônio ..... 100,00 mg  
Veículo q.s.p. .... 100,00 mL  
Produto pronto para uso.

### Indicações:

**Gentrin® Infusão Uterina** é indicado no tratamento das metrites e endometrites que acometem os bovinos, equinos e suínos causadas por: *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Corynebacterium pyogenes*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas* spp, *Klebsiella* spp, *Shigella* spp, *Samonella* spp, *Proteus* spp.

### Modo de uso e dosagem:

**Gentrin® Infusão Uterina** deve ser administrado diretamente no útero, com o auxílio de uma pipeta de inseminação artificial, obedecendo às dosagens abaixo:

### Dosagens:

Bovinos (vacas): 50 a 100 mL por infusão.  
Equinos (éguas): 100 a 200 mL por infusão.  
Suínos (porcas): 50 a 100 mL por infusão.

Se necessário, repetir a infusão durante 2 a 3 dias ou a critério do Médico Veterinário.

### Precauções:

Somente o médico veterinário está apto a fazer alterações na dosagem indicada e a fazer a aplicação (infusão) do produto. A infusão uterina deve ser realizada por pessoa habilitada, caso contrário, poderão ocorrer acidentes, como perfurações uterinas.

Não misturar no frasco do **Gentrin® Infusão Uterina** nenhum outro tipo de medicamento.

### Contraindicação:

O produto é contraindicado para animais com histórico de hipersensibilidade à gentamicina. Não administrar o produto a animais com função renal comprometida.

### Reações adversas:

Há possibilidade de reações alérgicas à gentamicina quando os animais são hipersensíveis. Pode ocorrer ototoxicidade ou nefrotoxicidade em tratamentos prolongados, porém, a reversão desses quadros geralmente ocorre após a suspensão do tratamento. Uma reação mais rara é o

bloqueio neuromuscular, que é revertido com a aplicação de gluconato de cálcio.

### ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

#### BOVINOS

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 14 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 01 DIA APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.**

#### EQUÍDEOS (*Equus caballus*/CAVALOS) E SUÍNOS

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 14 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

### Incompatibilidades:

A gentamicina é inativada pela administração concomitante de carbenicilina. Não administrar o produto concomitantemente com relaxantes músculo-esqueléticos,

pois aumenta a possibilidade de bloqueio neuromuscular. Não administrar o produto concomitantemente com furosemida ou anfotericina B, pois aumenta a possibilidade de ototoxicidade e nefrotoxicidade.

Conservar em local seco e fresco, entre 5°C a 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 3.821 em 11/10/91.

### Responsável Técnica:

Sandra Barioni Toma  
CRMV/SP 14.817

### Apresentação:

Frasco plástico com 100 e 500 mL.



Proprietário e fabricante:  
**Oufino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330 KM 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
Tel/Fax: 16 3518 2025  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
www.oufino.com  
Indústria brasileira

**100% brasileira, exportadora, gerando empregos no Brasil.**

