

Mastifin[®] Vaca Seca

Uso Veterinário

Fórmula:

Cada seringa de 10 g contém:
Sulfato de gentamicina 677,00 mg*
Excipiente q.s.p. 10,00 g
* Equivalente a 400,00 mg de gentamicina base.

Indicações:

Para o tratamento das mastites fora do período de lactação ("Vaca Seca").

Mastifin[®] Vaca Seca possui uma formulação especial desenvolvida para o tratamento e prevenção das mastites fora do período de lactação, com uma ação prolongada, que se estende por 4 semanas. A ação bacteriana da gentamicina atinge os principais agentes Gram-positivos e Gram-negativos causadores das mastites dos bovinos.

Agentes: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Corynebacterium spp*, *Escherichia coli*, *Micrococcus spp*, *Pseudomonas spp*, *Klebsiella spp*, *Serratia spp*, *Proteus spp*, *Enterobacter spp*.

Modo uso e dosagem:

Após a última ordenha da lactação e a desinfecção dos tetos, aplicar pela via intramamária, todo o conteúdo de 1 seringa, ou seja, 10 g em cada quarto do úbere, em dose única.

Recomenda-se fazer uma massagem de baixo para cima no úbere, para melhor dispersão do produto por toda a glândula mamária.

Contraindicações:

Não aplicar em vacas com histórico de hipersensibilidade à gentamicina.
Não aplicar em vacas em lactação.
Não aplicar em animais com problema de insuficiência renal.

Interações medicamentosas:

A gentamicina é inativada pela administração concomitante de carbenicilina.
Não administrar gentamicina concomitantemente com relaxantes músculo-esqueléticos, pois aumenta a possibilidade de bloqueio neuromuscular.
Não administrar gentamicina concomitantemente com

Furosemida ou Anfotericina B, pois aumenta a possibilidade de ototoxicidade e nefrotoxicidade.

bloqueio neuromuscular, que é revertido com a aplicação de gluconato de cálcio.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 28 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Reações adversas:

Há possibilidade de reações alérgicas à gentamicina, quando os animais são hipersensíveis.
Podem ocorrer ototoxicidade e nefrotoxicidade em tratamentos prolongados, porém, a reversão desses quadros geralmente ocorre após a suspensão do tratamento.
Uma reação mais rara é o

Restrições de uso:

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Conservar em local seco e fresco, entre 5° C a 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6.663 em 11/01/99.

Responsável Técnica:

Sandra Barioni Toma
CRMV/SP 14.817

Apresentação:

Seringa plástica descartável contendo 10 g.



Proprietário e fabricante:
Oufino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 KM 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.oufino.com
Indústria brasileira

100% brasileira, exportadora, gerando empregos no Brasil.

