

# Iver Gel Composto

## Uso Veterinário

### Fórmula:

Cada seringa de 9,60 g contém:  
Ivermectina ..... 0,120 g  
Praziquantel ..... 1,500 g  
Vitamina E ..... 0,600 g  
Veículo q.s.p. .... 9,600 g

### Indicações:

**Iver Gel Composto** é indicada para o tratamento e controle dos principais parasitas internos dos equinos, como:

#### Nematódeos gastrintestinais:

*Habronema* spp, *Trichostrongylus axei*, *Parascaris equorum*, *Strongyloides westeri*, *Oxyuris equi*, *Onchocerca* spp.

**Grandes strongilos:** *Strongylus vulgaris*, *Strongylus equinus*, *Strongylus edentatus*.

#### Pequenos Strongilídeos:

**Strongylinae:** *Triodontophorus* spp.

**Cyathostominae:** *Cyathostomum* spp, *Gyalocephalus* spp, *Cylicodontophorus* spp, *Cylicostephanus* spp, *Cylicocyclus* spp.

#### Nematódeo pulmonar:

*Dictyocaulus arnfieldi*.

#### Cestódeos:

*Anoplocephala* spp,  
*Paranoplocephala mamillana*,  
*Paranoplocephala perfoliata*.

#### Larvas de Dípteros:

*Gasterophilus nasalis*.

#### Habronemose:

*Habronema* spp e *Draschia* spp: larvas cutâneas (ferida de verão ou esponja).

### Modo de uso e dosagem:

**Iver Gel Composto** deve ser administrada por via oral, exclusivamente para equinos, aplicada sobre a língua do animal, no fundo da boca, que deve estar sem alimento, na dosagem de 1,60 g para cada 100 kg de peso, ou seja, 200 µg de Ivermectina, 2,5 mg de Praziquantel e 1 mg de vitamina E por kg de peso corporal, obedecendo à graduação que consta no êmbolo da seringa, sendo que a seringa completa é suficiente para tratar 600 kg de peso corporal, em dose única. As doses são graduadas para: 100 kg, 200 kg, 300 kg, 400 kg, 500 kg e 600 kg.

### Precauções:

Após a aplicação, manter a cabeça do animal levantada por

alguns segundos.

Não usar e não jogar embalagens vazias em rios ou lagos. Produto tóxico para peixes e alguns organismos aquáticos.

Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto.

### Contraindicações e limitações de uso:

**Iver Gel Composto** não possui contraindicações desde que se obedeça às indicações para o uso correto do produto.

### ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

#### EUÍDEOS

(*Equus caballus*/CAVALOS)

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 21 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

### Interação medicamentosa:

O uso concomitante com dexametasona reduz a eficácia do praziquantel.

### Reações adversas:

O produto não apresenta reações adversas, quando administrado dentro das recomendações.

Conservar em local seco e fresco, entre 5°C a 30°C, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário.

### Responsável Técnica:

Sandra Barioni Toma  
CRMV/SP 14.817

Licenciado no Ministério da Agricultura. sob n.º 7.850 em 05/07/2001.

### Apresentação:

Seringa descartável contendo 9,6 g.



Proprietário e fabricante:  
**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330 KM 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
Tel/Fax: 16 3518 2025  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
www.ourofino.com  
Indústria brasileira

100% brasileira, exportadora,  
gerando empregos no Brasil.

