

Maxicam Gel

Uso Veterinário

**Anti-inflamatório não esteroide com vitamina E para equídeos.
Ação anti-inflamatória mais potente e duradoura.
Sem complicações gástricas.**

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Meloxicam 4,50 g
Vitamina E (acetato) 7,50 g
Veículo q.s.p. 100,00 g

Indicações:

Maxicam Gel é um anti-inflamatório não-esteroide, com atividade inibidora seletiva da cicloxigenase-2 (COX 2), indicado nos seguintes processos inflamatórios dos equídeos:

- Patologias do aparelho locomotor e doenças músculo-esqueléticas, como: miosites, tendinites, osteítes, artrites, artrites reumatoides, osteoartrites, osteoartrose, sinovites, distensões miotendinosas, traumatismos, claudicações, síndrome do navicular, laminites e auxiliar na reparação de

fraturas.

- Afecções oculares: uveítes, conjuntivites, pós-operatório.
- Desordens de ordem reprodutiva como retenção de placenta.
- Metrites e mastites.
- Analgesia pré e pós-operatória.
- Auxiliar no tratamento de infecções bacterianas ou crônicas (pneumonias e diarreias) e quadros febris.

Modo de uso e dosagem:

Maxicam Gel deve ser administrado uma vez ao dia (a cada 24 horas), via oral, de acordo com a graduação da seringa. A seringa é graduada para 5 dias de tratamento para animais adultos. Para potros, administrar metade da dosagem (metade de uma graduação da seringa).



D: Dosagem J: Animais Jovens (potros) A: Animais Adultos

Dosagem para Equídeos (equinos, asininos e muares)

0,27 g de meloxicam para cada 450 kg de peso corporal.

(0,6 mg de meloxicam por kg de peso corporal)

0,45 g de vitamina E para cada 450 kg de peso corporal.

(1 mg de vitamina E por kg de peso corporal)

Duração do tratamento:

A duração média do tratamento é de 5 dias ou deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro clínico e tipo de afecção a ser tratada. Nas patologias

crônicas, podem ser necessários tratamentos prolongados por um período de até 14 dias ou a critério do médico veterinário.

Interações medicamentosas:

Não administrar juntamente com outros anti-inflamatórios. Recomenda-se um período de 24 horas de intervalo entre um tratamento e outro ou de acordo com a farmacocinética da droga anteriormente utilizada.

Não administrar juntamente com antibióticos do grupo dos aminoglicosídeos.

Não administrar juntamente com agentes anticoagulantes como a warfarina e a aspirina.

Contraindicações e limitações de uso:

Não administrar em animais com distúrbios cardíacos, hepáticos ou renais severos.

Não administrar em animais com ulceração gastrointestinal ou que apresentem desordens hemorrágicas ou hipersensibilidade ao produto. Evitar a administração em animais desidratados, hipovolêmicos ou hipotensos.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

EQUÍDEOS

(*Equus caballus*/ CAVALOS)

(*Equus asinus*/ ASININOS)

(*Equus caballus x Equus asinus*/ MUARES)

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 03 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Precauções:

Obedecer à dosagem e via de administração indicada para o uso do produto.

O tratamento de animais idosos ou com menos de 06 semanas de idade deve ser

acompanhado pelo médico veterinário.

Efeitos adversos:

Podem ocorrer reações gerais como diminuição do apetite, diarreia, melena e apatia. Estas reações são geralmente transitórias e tendem a desaparecer com a interrupção ou término do tratamento.

Informações para uso médico:

O meloxicam é um anti-inflamatório não-esteroide da família dos oxicans e não possui antídoto específico. No caso de intoxicações, realizar tratamento sintomático.

Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e administração sob orientação do médico veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.192 em 05/01/06.

Responsável Técnica:

Sandra Barioni Toma CRMV/SP 14.817

Apresentação:

Seringa plástica graduada contendo 30 gramas do produto.

 **ourofino**
saúde animal

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 KM 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.com
Indústria brasileira

**100% brasileira, exportadora,
gerando empregos no Brasil.**

