Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS:

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DOS BOVINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Conservar sob refrigeração, em temperatura entre 2 a 8°C, ao abrigo da luz solar intensa e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

O período de validade é de 24 meses após a data de fabricação.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.631 em 07/10/2011.

Responsável Técnica:
Dra. Sandra Barioni Toma
CRMV/SP 14.817

PRODUTO IMPORTADO

ourofino saúde animal

Representante exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 KM 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.com
Indústria brasileira

FUNDAÇÃO ABRINQ RECONHECE EMPRESA AMIGA DA CRIANÇA

100% brasileira, exportadora, gerando empregos no Brasil.

Proprietário e Fabricante:
Laboratório Biomega S.A.
Camino Paso Taborda s/n
Melo - Cerro Largo
Uruguai

500001192/1213 OF00

Sincro eCG

Uso Veterinário

Gonadotrofina coriônica equina injetável (eCG)

Fórmula

Frasco:
eCG (PMSG)
liofilizado ..... 6.000 UI
Excipiente ..... 0,052 g

Frasco com diluente (Água para injeção) ..... 30,00 mL

Indicações:

SINCRO eCG é recomendado para a estimulação do crescimento folicular levando assim a uma maior capacidade ovulatória das fêmeas bovinas em protocolos de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e transferência de embrião em tempo fixo (TETF). Pode ainda ser utilizado para superovulação de fêmeas bovinas.

Modo de uso e dosagens:

Diluição do produto:
Frasco com 6.000 UI de eCG e frasco com 30 mL de diluente estéril:
Adicionar 5 mL do diluente estéril no frasco contendo o liofilizado de 6.000 UI de eCG, homogeneizar e devolver o volume com o liofilizado ao frasco de diluente.

Usos:

-Estimulante de desenvolvimento folicular (protocolos de IATF):
Administrar uma dose de 300 UI, ou seja, 1,5 mL de **SINCRO eCG** por via intramuscular profunda, por animal.

-Indutor de múltiplas ovulações (protocolos de TETF em receptoras):

Administrar uma dose de 500 UI, ou seja, 2,5 mL de **SINCRO eCG** por via intramuscular profunda, por animal, no dia 5 do protocolo.
- Protocolo proposto para uso do **SINCRO eCG**:
Administrar em dia aleatório do ciclo estral (Dia 0) benzoato de estradiol associado a dispositivo intravaginal de progesterona. Cinco dias depois (D5) fazer a aplicação do **SINCRO eCG** de acordo com o objetivo proposto (estimulante de desenvolvimento folicular ou superovulação) garantindo seu efeito sobre o crescimento folicular. No Dia 8 (D8) fazer a remoção do dispositivo intravaginal de progesterona e administrar um análogo da prostaglandina (cloprostenol sódico). A indução da ovulação pode ser feita com o uso do cipionato de estradiol no momento da retirada do dispositivo ou com o benzoato de estradiol 24 horas após a retirada dos dispositivos. A inseminação deve ser feita após 48 a 72 horas da retirada do dispositivo e a TETF deve ser realizada após 9 dias da retirada dos dispositivos, conforme diagramas abaixo:

Protocolo de IATF



Protocolo de TETF



Uma vez que a resposta aos tratamentos hormonais é individualizada os protocolos e dosagens utilizadas podem ser alteradas a critério do médico veterinário.
Após reconstituição o produto poderá ser mantido por até 7 dias sob refrigeração em temperatura de 2 a 8°C.

Contraindicações e limitação de uso:

O uso de **SINCRO eCG** é contraindicado para animais com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.
Doses elevadas produzem superovulação não sendo aconselhável para animais a serem inseminados ou cobertos (monta natural) em virtude da possibilidade de gestações múltiplas, exceto para fins de transferência de embriões.
Não utilizar o produto em animais que não estejam em idade reprodutiva.
O sucesso da utilização de **Sincro eCG** é dependente de protocolos hormonais reprodutivos adequados e de fatores adequados no manejo do rebanho que reduzem o anestro e aumentam as taxas de prenhez como nutrição e sanidade.

Precauções:

Uso exclusivo em fêmeas bovinas.
Utilizar seringas e agulhas estéreis, observando as boas práticas de assepsia adotando devidos cuidados na manipulação.

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Somente o médico veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto.
Não utilizar o produto fora do prazo de validade.

Reações adversas:

Não são esperadas reações adversas quando o produto é utilizado dentro das recomendações indicadas.
Reações de hipersensibilidade e anafilaxia podem ocorrer em animais susceptíveis.

Apresentação:

Frasco com 6.000 UI de eCG e 2 ampolas com 15mL de diluente estéril cada ou frasco com 6.000 UI de ECG e frasco com 30 mL de diluente estéril.