Sincroforte®

Uso Veterinário

Análogo sintético do GnRH (hormônio liberador de gonadotrofinas)

Fórmula:
Cada 10 mL de solução injetável contém:
Acetato de buserelina ..... 0,042 mg(*)
Veículo aquoso q.s.p. ..... 10,00 mL
(*) equivalente a 0,04 mg de buserelina

Indicações:
Sincroforte® (acetato de buserelina) é um hormônio sintético análogo ao GnRH. O GnRH é um hormônio produzido pelo hipotálamo que estimula a hipófise anterior a secretar LH (hormônio luteinizante) e FSH (hormônio folículo estimulante). A buserelina é indicada para:

BOVINOS E BUBALINOS:
- Protocolos reprodutivos na indução da ovulação e luteinização de folículos (através da ação do LH).
- Incremento da fertilidade (aumento dos índices de concepção) na inseminação artificial.
- Tratamento de transtornos de fertilidade de origem ovariana: cistos foliculares, atraso na ovulação e anestro.

EQUINOS:
- Indução da ovulação e sincronização do tempo da ovulação e da monta.
- Transtornos císticos dos ovários.
- Incremento da fertilidade (aumento dos índices de concepção).

Modo de uso e dosagem:
Aplicar **Sincroforte®** preferencialmente pela via intramuscular. Também podem ser utilizadas as vias subcutânea e intravenosa.

Vacas e Búfalas:
Protocolos reprodutivos de inseminação artificial e sincronização de cio na indução da ovulação e luteinização de folículos: aplicar 2,5 mL de **Sincroforte®**.
Para tratamento de cistos foliculares: aplicar 5 mL de **Sincroforte®**, geralmente 8 dias após a aplicação já se pode comprovar a presença de um corpo lúteo. Se após 14 dias não se verificar a presença do corpo lúteo ou se aparecerem novos cistos, é necessário repetir o tratamento. Após a detecção do corpo lúteo ou após 8 dias do tratamento, pode-se proceder a aplicação de uma prostaglandina ou agente luteolítico para retorno à ciclicidade. O esquema "Ovsynch" também é indicado para tratamento de cistos foliculares.

Éguas:
Para indução da ovulação e sincronização de cio, aplicar 10 mL quando, após a palpação, for detectado folículo com tamanho maior que 35 mm.
Para incremento da fertilidade: 10 mL em dose única 12 dias após a inseminação ou a critério do médico veterinário.
Para tratamento de cistos foliculares: aplicar 10 mL. Geralmente 14 dias após a aplicação já se pode comprovar a presença de um corpo lúteo. Caso isso não ocorra, é necessário repetir o tratamento. Após a detecção do corpo lúteo ou após 14 dias do tratamento, pode-se proceder a aplicação de uma prostaglandina ou agente luteolítico para retorno à ciclicidade.

Espécie	Dose (mg)	Dose (mL)
Vacas	0,01 a 0,02 mg	2,5 a 5,0 mL
Búfalas	0,01 a 0,02 mg	2,5 a 5,0 mL
Éguas	0,04 mg	10 mL

Precauções:
Uso exclusivo em animais.
Utilizar agulhas e seringas esterilizadas, observando as boas práticas de assepsia.
Aplicar a dose recomendada. Somente o médico veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens.
A resposta da utilização de hormônios, com finalidade de sincronização do cio, depende do bom estado corporal em que o animal se encontra e da ausência de causas de baixa fertilidade como doenças reprodutivas e endócrinas.
Para tratamento de cistos foliculares não é necessário comprimi-los antes da aplicação do produto.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS E BUBALINOS
O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS E BUBALINOS TRATADOS.
O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS E BUBALINOS TRATADOS.
EQUÍDEOS
(*Equus caballus*/CAVALOS)
O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE EQUINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Contraindicações e limitações de uso:
Não utilizar medicamentos com o prazo de validade vencido.
Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes do produto.

Reações adversas:
O produto não apresenta reações adversas quando administrado dentro das recomendações indicadas.

Conservar o produto na embalagem original, em local seco e fresco, entre 5°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário.

Responsável Técnica:
Sandra Barioni Toma CRMV/SP 14.817

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.399 em 24/07/2008.

Apresentação:
Frasco de vidro contendo 10 mL e 20 mL.

ourofino saúde animal

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 KM 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.com
Indústria brasileira

100% brasileira, exportadora, gerando empregos no Brasil.

FUNDAÇÃO ABRINQ RECONHECE | EMPRESA AMIGA DA CRIANÇA

5000015471213 OF00