

## **2541 – FLUATAC DUO 4X5000ML**

CONCORRENTES: ACATAK / FLURON GOLD / SOLUTYCK VALLÉE / TACZURON ZOETIS / CONTRATAK /

### **FÓRMULA:**

Cada 100 ml contém:

Fluazuron ... 3,00 g

Abamectina ... 0,50 g

Veículo q.s.p ... 100,00 ml

Endectocida pour on para bovinos

### **INDICAÇÕES PRINCIPAIS:**

VET. JUNIOR: Produto pode ser aplicado em vaca prenhe e com terneiro mamando.

Fluatac Duo é indicado para o controle estratégico de carrapatos *Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus*, de mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*) e para o controle de bernes (larvas de *Dermatobia hominis*). Também é indicado para o tratamento de bovinos infectados por nematódeos gastrintestinais (*Haemonchus placei*, *Cooperia punctata*, *Oesophagostomum radiatum*, *Trichostrongylus axei*).

### **DOSAGENS:**

Fluatac Duo deve ser administrado pela via tópica (pour on), com aplicação na linha dorsal dos bovinos (fio do lombo), na dose de 1 ml para cada 10 kg, conforme tabela abaixo. Produto para aplicação em dose única.

51 - 100 kg = 10 ml de Fluatac Duo

101 - 150 kg = 15 ml

151 - 200 kg = 20 ml

201 - 250 kg = 25 ml

251 - 300 kg = 30 ml

301 - 350 kg = 35 ml

351 - 400 kg = 40 ml

401 - 450 kg = 45 ml

451 - 500 kg = 50 ml

501 - 550 kg = 55 ml

551 - 600 kg = 60 ml

601 - 650 kg = 65 ml

Acima de 650 kg = 1 ml/ 10 kg

### **POSSÍVEIS EFEITOS COLATERAIS:**

O produto quando usado nas dosagens indicadas não provoca reações adversas. Entretanto, reações de hipersensibilidade individual podem ocorrer.

### **RESTRICÇÕES DE USO:**

Não aplicar em bezerros com idade inferior a 16 semanas.

**PRODUTO INDICADO EXCLUSIVAMENTE PARA BOVINOS DE CORTE. NÃO UTILIZAR EM VACAS PRODUTORAS DE LEITE PARA CONSUMO HUMANO.**

Não é conhecida nenhuma interação medicamentosa com os princípios ativos.

#### INTOXICAÇÃO E SUPERDOSAGEM NOS ANIMAIS:

No caso de intoxicação por alta dosagem, os animais podem apresentar depressão motora geral, aumento da taxa respiratória, tremores musculares, midríase e rigidez extensa. Não há antídoto. O tratamento deve ser sintomático.

#### PERÍODO DE CARÊNCIA:

Não destinar ao consumo humano a carne de animais tratados antes de transcorridos 60 dias após a última aplicação.

#### COMPLEMENTO:

Comparado com os demais produtos do mercado o Fluatac Duo possui 20% a mais de concentração que os concorrentes.

Comparado o Fluatac Duo com os concorrentes percebe-se no Fluatac que a limpeza começa a partir do 3 ao 5 dia e os concorrentes somente do 15 ao 17 dia.

#### PROTÓCOLO:

Baixas infestações:

Dia 0 ... Dia 42 ... Dia 100 (opcional) se necessário.

Altas infestações:

Dia 0 = colosso ... Dia 7 a 14=fluatac ... Dia 35 a 40... Dia 63 a 70

#### PRECAUÇÕES:

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Somente o médico veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto.

Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

Após aberta a embalagem, utilizar o produto em até 4 meses.

Recomenda-se o uso de luvas de borracha para o manuseio e aplicação do produto.

Não fumar e não manipular alimentos durante a aplicação do produto.

Evitar contato direto com a pele e retirar com água qualquer derramamento acidental.

As embalagens vazias devem ser enterradas ou queimadas.

A exposição direta à luz solar ou a altas temperaturas poderá degradar o produto.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9557 em 18/03/2010.

#### APRESENTAÇÃO:

Frasco plástico com dosador contendo 1 litro.