

268 - CYPERMIL POUR ON 10X1000ML

FÓRMULA:

Cada 100 ml contém:

Cipermetrina 5,00 g

Veículo q.s.p. 100,00 ml

INDICAÇÕES:

Carrapaticida - Elimina todas as fases do carrapato dos bovinos *Boophilus microplus*.

Mosquicida e repelente

Elimina as moscas adultas vetoras da mosca do berne *Dermatobia hominis*, *Musca domestica* e *Stomoxys calcitrans*.

Combate a *Haematobia irritans* mosca-dos-chifres.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

A dosagem recomendada é de 10 ml para cada 100 kg de peso vivo, obedecendo a tabela:

Peso Dose

100 kg ... 10 ml

200 kg ... 20 ml

300 kg ... 30 ml

400 kg ... 40 ml

500 kg ... 50 ml

Dosagem para combate à mosca-dos-chifres: apenas 10 ml.

Para animais acima de 500 kg de peso vivo a dose máxima recomendada é de 50 ml.

O produto deverá ser aplicado em toda linha dorsal dos bovinos, da inserção da cauda, até o meio do pescoço.

ADMINISTRAÇÃO:

O produto deverá ser aplicado em toda linha dorsal dos bovinos, da inserção da cauda, até o meio do pescoço.

PRECAUÇÕES:

- Usar sempre a luva que acompanha o produto, ao manusear o mesmo.
- Conservar o produto na embalagem original, em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar.
- Guardar fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não guardar junto de alimentos, medicamentos, bebidas, produtos de higiene e domésticos.
- Não reutilizar embalagens vazias.
- Desaconselhamos a aplicação do produto nas horas de calor intenso, ou nos dias chuvosos.
- Não jogar o produto ou restos da embalagem em açudes, rios e tanques de água.
- Produto tóxico para peixes.
- Aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

OBSERVAÇÕES:

GRUPO QUÍMICO: Piretróide.

Não possui antídoto. Aplicar tratamento sintomático.

Se ocorrer intoxicação humana, chamar imediatamente o médico, e enquanto isso, caso tenha ocorrido ingestão acidental do produto, provocar vômito, introduzindo o dedo na garganta, ou por via oral, administrar um copo de água morna. Repetir até que o vômito seja um líquido claro. Se possível entregue ao médico a embalagem do produto. Se o produto atingir os olhos, lavar imediatamente com água abundante, durante 15 minutos.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

Cypermil® Pour On não deixa resíduos na carne ou no leite.

APRESENTAÇÃO:

Frasco de plástico com 250 e 1.000 ml e galão plástico contendo 5.000 ml.

CLASSE TERAPÊUTICA:
ECTOPARASITICIDAS (ANTI-PARASITÁRIOS)

PRINCÍPIO(S) ATIVO(S):
CIPERMETRINA