

2928 ELO-XICAM COMPRIMIDOS 0,5 MG

FÓRMULA: Cada comprimido de 200 mg contém:

Meloxicam.....0,5 mg

Excipiente q.s.p.....200 mg

INDICAÇÕES:

ELO-XICAM COMPRIMIDOS 0,5 MG é um potente anti-inflamatório não esteroide inibidor de tromboxanos e prostaglandinas, com excelentes propriedades antipirética e analgésica. Meloxicam é considerado inibidor preferencial da ciclooxigenase – 2 (COX 2) (seletivo), resultando em menores efeitos colaterais e sem complicações gástricas, por um período maior de tratamento.

ELO-XICAM COMPRIMIDOS 0,5 MG é indicado em processos inflamatórios dos cães e gatos, nas patologias dolorosas agudas. A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Administrar por via oral.

DOSE PARA CÃES:

PRIMEIRO DIA DE TRATAMENTO: 2 comprimidos de ELO-XICAM COMPRIMIDOS 0,5 MG para cada 5 kg de peso corporal (0,2 mg de meloxicam por kg de peso corporal).

SEGUNDO DIA DE TRATAMENTO: 1 comprimido de ELO-XICAM COMPRIMIDOS 0,5 MG para cada 5 kg de peso corporal (0,1 mg de meloxicam por kg de peso corporal)

ELO-XICAM COMPRIMIDOS 0,5 MG deve ser administrado a cada 24 horas. Recomenda-se um tratamento de 5 a 7 dias consecutivos nos casos de patologias agudas.

A duração do tratamento deverá ser determinada conforme orientação do Médico Veterinário e/ou de acordo com a gravidade da patologia.

DOSE PARA GATOS:

DOSE ÚNICA: 1 comprimido de ELO-XICAM COMPRIMIDOS 0,5 MG para cada 5 kg de peso corporal (0,1 mg de meloxicam por kg de peso corporal).

ELO-XICAM COMPRIMIDOS 0,5 MG deve ser administrado a cada 24 horas. Recomenda-se que o tratamento não ultrapasse 4 dias.

CONTRAINDICAÇÕES E RESTRIÇÕES:

Cães e gatos com histórico de distúrbios gastrointestinais ou doenças renais, cardíacas e hepáticas apresentam maior risco de desenvolver efeitos adversos.

A segurança em fêmeas gestantes não foi estabelecida. Elo-xicam Comprimidos 0,5 mg não deve ser indicado para animais com hipersensibilidade ao ativo Meloxicam.

Não administrar em animais com possível ulceração gastrointestinal ou que apresentem evidência de desordem hemorrágica.

Não utilizar o produto em intoxicações por drogas anticoagulantes (Ex: Cumarina).

PRECAUÇÕES DE USO:

Ter cautela em animais desidratados, hipovolêmicos, ou hipotensos, devido ao risco de desenvolvimento de toxicidade renal.

Obedecer às dosagens e a via de administração indicada na posologia deste produto.

Obedecer às contraindicações e limitações de uso do produto.

Atentar para o prazo de validade do produto após a abertura da embalagem.

Ler a bula atentamente antes de administrar o produto.

Interromper o tratamento em caso de vômitos, diarreias ou perda de apetite.

REAÇÕES ADVERSAS E EFEITOS COLATERAIS:

Podem ocorrer reações adversas como perda de apetite, diarreias e vômitos; nestes casos interromper o tratamento.

Os choques anafiláticos em animais devido ao uso do Meloxicam são raros, no entanto, o Médico Veterinário deve estar atento à possibilidade da ocorrência.

Estas reações são geralmente transitórias e tendem a desaparecer no término do tratamento.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Não administrar junto a outros anti-inflamatórios esteroides e não esteroides. Os anti-inflamatórios esteroides podem agravar os efeitos gastrointestinais.

Não administrar juntamente com antibióticos do grupo dos aminoglicosídeos (Estreptomicina, Gentamicina, Kanamicina e Neomicina).

Não administrar junto com anticoagulantes como Varfarina e Aspirina.

INFORMAÇÕES PARA USO MÉDICO:

O Meloxicam anti-inflamatório não esteroide da família dos Oxicans e não possui antídoto específico. No caso de intoxicação e superdosagem sugere-se tratar sintomaticamente e com suporte geral.

APRESENTAÇÃO:

Cartucho contendo 1 blister com 10 comprimidos de Elo-xicam comprimidos 0,5 mg. Conservar à temperatura ambiente (15 graus a 30 graus), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

VENCIMENTO:

2 (dois) anos após a data da fabricação.