

## **1383 FLOXICLIN 6X500ML**

### **COMPOSIÇÃO:**

Enrofloxacino...10g

Veículo q.s.p. ...100mL

### **INDICAÇÕES:**

FLOXICLIN é uma solução antimicrobiana, com amplo espectro de ação, indicada no tratamento de diversas doenças infecciosas dos caninos, causadas por bactérias GRAM - positivas, GRAM - negativas e microplasma sensíveis ao Enrofloxacino.

FLOXICLIN é eficaz no tratamento das:

- Enterites bacterianas agudas, subagudas e crônicas), gastroenterites, diarréias e demais afecções do trato digestivo, de etiologia infecciosa, causada por: Escherichia coli e Salmonella spp.
- Infecções dérmicas, tais como piodermite, causadas por: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus intermedius, Escherichia coli, Pseudomonas spp. e Proteus mirabilis.
- Infecções do trato respiratório, tais como pneumonias, broncopneumonias e bronquites (agudas, subagudas e crônicas) causadas por: Escherichia coli, Pasteurella spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp., Haemophilus spp. e Mycoplasma spp.
- Infecções do aparelho genitourinário, tais como nefrite, pielonifrite, cistite, orquite e prostatite, causadas por Escherichia coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Pseudomonas spp., Enterobacter spp., Proteus spp., Klebsiella spp., Brucella spp. e Mycoplasma spp.
- Otites causadas por: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Pseudomonas spp. e Proteus spp.
- Profilaxia nas infecções pós-operatórias tais como: castrações, laparotomias e lesões de pele em geral.

### **CONTRA INDICAÇÕES:**

De acordo com estudos toxicológicos, o enrofloxacino está contra-indicado em cães na fase de crescimento rápido (de 2 a 8 meses\_ devido a relatos de lesões à cartilagem articular nessa faixa etária. Nas raças gigantes, este período poderá estender-se até os 18 meses.

### **VIA DE ADMINISTRACAO E MODO DE USAR:**

FLOXICLIN deve ser aplicado pelas vias subcutânea ou intramuscular. Não ultrapassar a dose de 10 ml por local de aplicação. Havendo necessidade de doses superiores, dividir o volume a ser aplicado em dois pontos de aplicação.

### **POSOLOGIA:**

A dose recomendada é 2,5 mg de Enrofloxacino por Kg de peso, para bovinos, suínos, ovinos e caprinos, o que correspondente a 1 ml de FLOXICLIN para cada 40 kg de pesocorporal, uma vez ao dia, durante 3 - 5 dias consecutivos.

Já para caninos, a dose terapêutica é de 5 mg de Enrofloxacino por kg de peso corporal, ou seja, 0,5 ml (meio ml) de FLOXICLIN para cada 10 kg de peso corporal, uma vez ao dia, durante 3 - 5 dias consecutivos.

### **PRECAUÇÕES E RESTRIÇÃO DE USO:**

Deve ser evitada a associação de qualquer quinolona com complexos vitamínicos ou soluções que contenham ferro, zinco, manganês e cálcio, já que estes compostos, reduzem a sua absorção.

Deve ser usado criteriosamente e com acompanhamento constante em pacientes com insuficiência renal.

Respeitar as indicações, modo de emprego e posologia indicadas.

#### PERÍODO DE CARÊNCIA:

Não abater bovinos, ovinos e caprinos destinados ao consumo humano antes de decorridos 28 (vinte e oito) dias após o término do tratamento.

Não abater suínos destinados ao consumo humano antes de decorridos 7 (sete) dias após o término do tratamento.

O leite dos animais tratados, não deve ser destinado ao consumo humano, antes de decorridos 72 horas (3 dias) do término do tratamento.