

2707- ENRAGOLD 25 KG

FÓRMULA:

Cada 100 g de produto contém:

Enramicina 8 g

Veículo q.s.p. 100 g

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Farelo de milho 92%, Enramicina.

EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS:

Não há substitutivos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO:

GARANTIAS	VALOR	UNIDADE
Enramicina	80,00	g/kg

INDICAÇÃO DE USO:

É indicado para uso em frangos de corte nas fases pré- inicial, inicial ou crescimento e final, para maximizar o ganho de peso e melhorar a conversão alimentar.

MODO DE USAR:

Frangos de corte nas fases pré- inicial, inicial ou crescimento: O produto deverá ser misturado à ração dos frangos na proporção de 63 a 125 gramas de Enragold por tonelada de ração, correspondente a 05 e 10 ppm de enramicina, respectivamente.

Frangos de corte na fase final: O produto deverá ser misturado a ração dos frangos na proporção de 38 a 63 gramas de Enragold por tonelada de ração, correspondente a 03 e 05 ppm de enramicina, respectivamente. Para garantir uma distribuição homogênea do Enragold na ração, é recomendável fazer-se uma pré mistura com milho moído ou farelo de soja e, posteriormente misturar na ração. É recomendável também que não se misture o produto ao mesmo tempo com o óleo vegetal quando este for adicionado à ração.

PERÍODO DE RETIRADA:

O produto não requer período de carência anteriormente ao abate dos animais.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Deve ser mantido em sua embalagem original, bem fechado e acondicionado em local fresco, seco e longe de produtos tóxicos, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Produto de uso exclusivo na alimentação animal.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO:

Mantenha o produto fechado, longe de aquecimento e de fontes de ignição. Manter longe de agentes incompatíveis como agentes oxidantes, ácidos e álcalis. Recipientes vazios podem apresentar riscos de incêndio. Ao manusear o produto, utilizar os equipamentos de proteção individual (roupa protetora, luvas, impermeáveis, óculos protetores para os olhos e máscara contra pó). Após manipulação do produto, os operadores devem se lavar completamente com água e sabão. Em caso de contato acidental com os olhos ou com a pele, lavar imediatamente com água em abundância. No caso de inalação ou ingestão procurar auxílio médico.