2148 - MASTER LP INJETAVEL 10X200ML

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Ivermectina.....4,000 g
Veículo.q.s.p.....100,00 mL

INDICAÇÕES:
Master LP é um endectocida de amplo espectro, de ação prolongada e liberação programada. Combate nematódeos (vermes gastrintestinais e pulmonares). É bernicida, sarnicida e piolhicida. Controla o carrapato dos bovinos e previne bicheiras (miíases).
Agentes etiológicos susceptíveis:

Parasitos Internos:
Nematódeos gastrintestinais:
Ostertagia ostertagi .....adultos e imaturos (inclusive larvas inibidas - hipobióticas).
Haemonchus placei.....adultos e imaturos.
Trichostrongylus axei .....adultos e imaturos.
Trichostrongylus colubriformis.....adultos e imaturos.
Cooperia spp.....adultos e imaturos.
Cooperia oncophora .....adultos.
Cooperia punctata.....adultos.
Strongyloides papillosus.....adultos.
Nematodirus spp.....imaturos.
Oesophagostomum radiatum.....adultos e imaturos.
Oesophagostomum venulosum.....adultos.
Trichuris spp.....adultos.
Nematódeo pulmonar:
Dictyocaulus viviparus.....adultos e imaturos.

Parasitos Externos:
Bernes: Larvas de Dermatobia hominis, Hypoderma bovis e H. lineatum.
Ácaros: Chorioptes bovis*, Sarcoptes scabiei - var. bovis
*Auxilia no controle desse parasito, quando usado como parte de um programa contínuo.
Piolhos: Linognathus vituli, Haematopinus euriysternus, Solenopotes capillatus, Damalinia bovis.
Carrapato: Controle do carrapato comum dos bovinos (Boophilus microplus).
Auxilia no controle da miíase cutânea (bicheiras) causada pelo estágio larval da mosca Cochliomyia hominivorax, quando administrado como preventivo.

DOSAGEM:
Aplicar por via subcutânea, 1 mL para cada 50 kg de peso corporal, conforme tabela abaixo:
25 kg ..... 0,5 mL
50 kg ....1,0 mL
100 kg ..... 2,0 mL
200 kg ..... 4,0 mL
300 kg ..... 6,0 mL

400 kg ..... 8,0 mL
500 kg ..... 10,0 mL
Peso (kg) Dosagem (mL) 1 mL a cada 50 kg
Dosagem equivalente por kg de peso corporal: 800 mcg de ivermectina.

ADMINISTRAÇÃO:
Aplicar por via subcutânea.

PRECAUÇÕES:
Obedecer às dosagens recomendadas para o uso do produto.
As embalagens vazias devem ser enterradas ou queimadas.
Não jogar em rios ou lagos.
Produto tóxico para peixes e alguns organismos aquáticos.
Somente o médico veterinário está apto a fazer alterações na dosagem do produto.
Contra-indicações e limitações de uso:
Não destinar ao consumo humano o leite dos animais tratados.
Não administrar o produto por via intravenosa.
Não utilizar medicamentos com o prazo de validade vencido.
Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes do produto.

REAÇÕES ADVERSAS:
O produto não apresenta reações adversas quando administrado dentro das recomendações indicadas.

PERÍODO DE CARÊNCIA:
Não destinar ao consumo humano a carne dos animais tratados antes de decorridos 130 dias da última aplicação do produto.
Não destinar o leite dos animais tratados ao consumo humano.

APRESENTAÇÃO:
Frasco contendo 20 mL, 50 mL, 200 mL, 500 mL e 1 L.

CLASSE TERAPÊUTICA:
ENDECTOCIDAS (AÇÃO EM ENDOPARASITAS E ECTOPARASITAS) (ANTI-PARASITÁRIOS)

PRINCÍPIO(s) ATIVO(s):
IVERMECTINA