

235 - CREOLINA 12X50ML

2509 - CREOLINA 10X1000ML

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Óleo carbólico.....31,2 g
Fenol.....15,5 mL
Veículo qsp.....100 ml

INDICAÇÕES:

A Creolina possui em sua fórmula fonte de compostos fenólicos, uma mistura de Cresóis e Fenóis associados a hidrocarbonetos aromáticos na forma miscível, produzindo um tipo de emulsão essencialmente fina em diluição na água. Possui eficácia nas seguintes indicações: No tratamento das miíases (bicheiras) - larvas de *Cochliomyia hominivorax*; como desinfetante de instalações rurais, tais como: granjas, aviários, pocilgas, estábulos, haras, cocheiras, canis e galpões, assegurando o mais amplo espectro de ação bactericida e fungicida sobre os microorganismos:

EFICÁCIA NAS DILUIÇÕES DE 2% : *Escherichia coli*, *Candida albicans*, *Klebsiella pneumoniae*, *Listeria monocytogenes*, *Proteus vulgaris*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella choleraesuis*, *Salmonella typhimurium*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*.

EFICÁCIA APENAS NA DILUIÇÃO DE 4% : *Escherichia coli*, *Candida albicans*, *Klebsiella pneumoniae*, *Listeria monocytogenes*, *Proteus vulgaris*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella choleraesuis*, *Salmonella typhimurium*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus agalactiae*, *Staphylococcus pseudintermedius*.

MODO DE USAR: USO EXTERNO

TRATAMENTO DE MIÍASE (bicheiras): uso tópico, aplicar 1 mL sobre cada lesão, em uma única aplicação.

COMO GERMICIDA: fazer diluições de 2,0% ou 4,0% em água (vide tabela) e manter a solução em contato com a superfície a ser desinfetada durante 10 minutos.

SUGESTÃO DE DILUIÇÃO:

VOLUME DE CREOLINA	VOLUME DE ÁGUA – 2%	VOLUME DE ÁGUA – 4%
50 mL	2,5L	1,25L
100 mL	5L	2,5L

FARMACODINAMICA:

O cresol e fenol possuem ação bactericida, atuam sobre o protoplasma bacteriano, causando desnaturação e precipitação de proteínas e destruindo o micro-organismo.

CONTRAINDICAÇÃO:

Não usar em felinos.

PERÍODO DE CARÊNCIA E RESTRIÇÕES DE USO:

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA: BOVINOS: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DOS BOVINOS TRATADOS. O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O LEITE DOS BOVINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA OU CARTUCHO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA CONSUMO.

PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de inalação, remover o paciente imediatamente do local e levá-lo para ambiente de ar fresco. Em caso de contato acidental com a pele, retirar imediatamente roupas e sapatos que tiverem sido atingidos pelo produto. Lavar a pele afetada abundantemente com água por pelo menos 15 minutos. Em contato acidental com os olhos, imediatamente lavar os olhos abundantemente com água limpa separando as pálpebras com os dedos por pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão, lave a boca abundantemente com água limpa. **NÃO PROVOCAR VÔMITO.** Procurar o socorro médico imediato, com indicação do produto ingerido (se possível, levar a embalagem do produto). Em todos os casos, procurar assistência médica imediatamente.

CUIDADOS NO MANUSEIO DO PRODUTO:

Use protetor ocular.

O produto é irritante para os olhos. Ocorrendo contato do produto com os olhos, lave-os imediatamente.

Use máscaras cobrindo o nariz e a boca. Produto perigoso se inalado ou aspirado. Caso haja inalação ou aspiração, procure local arejado.

Use luvas de borracha, macacão com mangas compridas, avental impermeável e botas. Produto irritante.

Ao contato do produto com a pele, lave-a imediatamente.

ANTIDOTO:

Não há antídoto específico, tratamento sintomático.

GRUPO QUÍMICO:

Fenóis.

PRECAUÇÕES GERAIS:

Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. Não manuseie o produto com as mãos desprotegidas. Não contamine coleções de água de qualquer natureza. Descartar as embalagens vazias e restos de produtos, bem como limpar os equipamentos ou recipientes usados de forma segura, evitando a contaminação do meio ambiente.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em temperatura ambiente em local seco e fresco sem exposição à luz solar direta e umidade. Conservar o produto em sua embalagem original.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

APRESENTAÇÕES:

Frascos: 50 mL e 100 mL