

## **3818 - FORMIMAX 12X100ML**

### **COMPOSIÇÃO:**

(RS) 5 – amino – 1 – (2,6 – dichloro – a,a,a – trifluoro – p – tolyl) – 4 – trifluoromethylsulfinylpyrazole – 3 – carbonitrile, fipronil, 0,04% p/p. e veículo.

### **DESCRIÇÃO:**

Formimax Spray é a forma mais fácil de matar as formigas da cozinha ou do campo e outros insetos indesejados. O interessante é que, ao invés de matar apenas aquela formiga cujo produto é aplicado, Formimax acaba com todo o formigueiro, pois essa formiga contaminada leva o produto para as demais.

É por isso que poucas borrifadas de Formimax em algumas formigas são suficientes para acabar com uma colônia de formigas.

### **FORMA DE APLICAÇÃO:**

É de pulverização sobre as formigas, através da válvula de spray, sendo que esta pulverização, não pode afoga-las, ou seja, de 2 a 4 borrifadas, é o suficiente para eliminá-las, elas tem que entrar em sua colonia molhadas para que se contaminem, e ai ocorrerá a eliminação das outras formigas.

### **DOSE DE APLICAÇÃO:**

De 2 a 4 borrifadas por colônia de formigas, quanto maior o numero de formigas atingidas maior será o resultado. Deve ser novamente aplicado em caso de grande infestação.

### **PRECAUÇÕES:**

**CUIDADO, PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.**

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Não aplique sobre alimentos, utensílios de cozinha e aquários. Não aplicar em hortas e pomares. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água corrente e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância. Se inalado com excesso, remover a pessoa para local ventilado. Proteja os olhos durante a aplicação.

Usar proteção respiratória (máscara) e óculos durante a aplicação.

### **RECOMENDAÇÕES:**

Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Utilizar luvas para manuseio e aplicação do produto. Aplicar o produto em locais de difícil acesso a crianças e animais domésticos. O período de reentrada dos habitantes no ambiente desinfestado é de 6 horas após a aplicação do produto.

### **INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:**

Grupo químico: Pirazol

Nome comum: Fipronil

Antídoto: Não há antídoto específico

Tratamento: Tratamento sintomático

APRESENTAÇÃO:  
Frasco-spray de 100ml.