ourofino

Sincrogest®

Uso Veterinário/Uso Veterinario

Dispositivo Intravaginal de
Liberação Lenta de Progesterona

Dispositivo Intravaginal de
Liberación Lenta de Progesterona

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 21 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE RÓTULO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

10 unidades

Conteúdo: 10 dispositivos de 20 g cada.
Contenido: 10 dispositivos de 20 g cada.

CPE0413303143

Sincrogest®

Uso Veterinário/Uso Veterinario

Dispositivo Intravaginal de Liberação Lenta de Progesterona

Descrição:
Sincrogest® é um dispositivo intravaginal impregnado com progesterona utilizado para a regulação do ciclo estral em bovinos, programas de inseminação artificial, programas de superovulação de doadoras e sincronização de receptoras.

Fórmula:
Cada Dispositivo contém:
Progesterona..... 1 g
Excipiente.....19 g

Ação:
A progesterona liberada pelo dispositivo atinge níveis supraluteais (superiores a 1ng/mL) poucas horas após sua colocação, exercendo um importante efeito sobre a dinâmica folicular e sobre o ciclo estral. Em associação com estrógenos, a progesterona provoca regressão do folículo dominante e início de uma nova onda folicular. Após a retirada do dispositivo e a consequente queda dos níveis de progesterona, o bloqueio do eixo hipotálamo-hipofisário é liberado, permitindo o desenvolvimento final do folículo e a ovulação. Vários protocolos, associando a progesterona a outros hormônios, foram desenvolvidos com diversas finalidades, tais como: sincronização de cios e ovulações para inseminação em tempo fixo, sincronização de receptoras, superovulação programada de doadoras, entre outros.

Indicações:
Controle do ciclo estral em vacas e novilhas.

Modo de uso:
Com o uso do aplicador específico, inserir o dispositivo na vagina do animal, deixando a cauda plástica do produto para fora do vestíbulo vulvar, para sua posterior remoção.

Precauções:
Para a colocação no animal, o operador deverá guardar as boas normas de higiene, conservando a limpeza do material e do animal. Recomenda-se lavar e desinfetar o aplicador logo após o uso.
Armazenar em local seco, fresco, ao abrigo da luz solar direta e à temperatura ambiente (15°C a 30°C). Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Evitar manipular o produto sem o uso de luvas.

Efeitos colaterais:
Não há efeitos colaterais associados à progesterona. Ocasionalmente, pode-se perceber sinais de vaginite leve que desaparece espontaneamente após a retirada do produto, não comprometendo a eficácia do tratamento nem a saúde do animal.

Período de carência:
Não há restrição para o consumo humano de leite de animais tratados com **Sincrogest®**. Os dispositivos devem ser retirados 21 dias antes do abate de animais destinados ao consumo humano.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Apresentação:
Bolsas contendo 2, 5, 10, 25, 50 e 100 dispositivos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob número 9234/2006.

Responsável Técnica: Sandra Barioni Toma CRMV/SP 14.817

Proprietário e Fabricante: / Elaborado por:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.com
Indústria Brasileira/Industria Brasileña

Vencedor do Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica 2005.

PART.:

FABR.:

VENC.:

Dispositivo Intravaginal de Liberación Lenta de Progesterona

Descripción:
Sincrogest® es un dispositivo intravaginal impregnado con progesterona utilizado para la regulación del ciclo estral en bovinos, programas de inseminación artificial, programas de superovulación de donadoras y sincronización de receptoras.

Composición:
Cada dispositivo contiene:
Progesterona..... 1 g
Excipiente..... 19 g

Acción:
La progesterona que el dispositivo libera llega a niveles supraluteales (superiores a 1 ng/ml) pocas horas después de su colocación, ejerciendo un importante efecto sobre la dinámica folicular y sobre el ciclo estral. En asociación con estrógenos, la progesterona provoca la regresión del folículo dominante e inicio de una nueva onda folicular. Tras la retirada del dispositivo y la consecuente disminución de los niveles de progesterona, el bloqueo del eje hipotálamo-hipofisario se libera, permitiendo el desarrollo final del folículo y la ovulación. Se desarrollaron varios protocolos asociando la progesterona a otras hormonas, con diversas finalidades, tales como: sincronización de celos y ovulaciones para inseminación en tiempo fijo, sincronización de receptoras, superovulación programada de donadoras, entre otras.

Indicaciones:
Control del ciclo estral en vacas y novillas.

Modo de uso:
Con el uso del aplicador específico, inserte el dispositivo en la vagina del animal, dejando la cola plástica del producto hacia afuera del vestíbulo vulvar, para su posterior remoción.

Precauciones:
Para la colocación en el animal, el operador deberá mantener las buenas normas de higiene, conservando la limpieza del material y del animal. Se recomienda lavar y desinfectar el aplicador después de su uso.
Almacénelo en un lugar seco, fresco, al abrigo de la luz solar directa y a temperatura ambiente (15°C a 30°C). Manténgalo fuera del alcance de los animales domésticos.
Manténgalo fuera del alcance de los niños.
Evite trabajar con el producto sin el uso de guantes.

Efectos colaterales:
No hay efectos colaterales asociados a la progesterona. Ocasionalmente, se pueden notar señales de vaginitis leve que desparecen espontáneamente tras la retirada del producto, sin que comprometa la eficacia del tratamiento ni la salud del animal.

Tiempo de Retiro:
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 0 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

Consulte al médico veterinario. Venta bajo prescripción del médico veterinario.

Presentaciones:
Bolsas conteniendo 2, 5, 10, 25, 50 y 100 dispositivos.

Responsable Técnica: Sandra Barioni Toma CRMV/SP 14.817

Importado y distribuido por:
Bolivia: Reg. SENASAG P&V F - Nº 381809 - SERVI-INSUMOS BOLIVIA IMPORT EXPORT - Santa Cruz de la Sierra – Bolivia - Nº Registro CR-EMP Nº 07-0099/09, Libro Nº 01/10 - SENASAG - NIT: 3242520015 - Tel.: (591-3) 351 9952
Colombia: Reg. ICA Nº 7902-MV - CDR Biotecnología Reproductiva - Zipaquira, Tel: (311) 259 9024 / BRACOL AGRONEGOCIO S.A.S - Carrera 50 C Nº 10 Sur 120 Local 111 Medellín, Colombia – Tel.: 4-2855075
Guatemala: Reg BR211-26-12-957 Registrante: CARVET Importador y Distribuidor: Segasa, Tel (502) 7947 – 8721
México: Reg. SADARPA Q-7750-056, Ourofino de México S.A. de C.V., Avenida Guadalupe, #5134 Int, B, Colonia Jardines de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, México CP. 45030, Tel: 01 33 3620 3812
Nicarágua: Reg. 7905, CISA AGRO S.A. - Tel.: (505) 2276 8710
Panamá: Reg. RF 4744-09 - FERTICA S.A. - Via Interamericana, Coquito, David, Chiriquí, República de Panamá - (507) 775-2512
Paraguay: Reg. SENACSA 11.008 - AGROVETERINARIA PROVET DE MANUEL CARVALLO – Asunción – Paraguay - pyprovet@tigo.com.py - RUC 421306-8 - Reg. MAG 429 - CI 421306
Venezuela: Semillas Magna C.A. - Prados del Este - Caracas / Venezuela Tel: (58) 212 976 6140 - RIF: J-30569149-5 - Reg. INSAI2041PI33N072315 - Asesora Tecnica: Drª. Judith Santos de Rojas.

7 898019 863944

Importado y distribuido por:

Lote Nº:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

S0000750/1213 OP00